

Rapport VII: Communauté Germanophone

Enquête de Santé par Interview, Belgique 2008



Référence:

Demarest S, Drieskens S, Gisle L, Van der Heyden J, Tafforeau J.

**Enquête de santé, 2008
Rapport VII – Communauté Germanophone**

Direction Opérationnelle Santé publique et surveillance, 2010, Bruxelles,
Institut Scientifique de Santé Publique.

ISSN: 2032-9180 – Numéro de dépôt. D/2010/2505/79 – IPH/EPI REPORTS N° 2010/074

Soutien administratif:

**Schoonenburg Monique
Verhocht Véronique**

Le projet est financièrement soutenu par:

Laurette Onkelinx, Vice-Première Ministre du Gouvernement Fédéral et Ministre fédéral des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale

Jo Vandeurzen, Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille

Fadila Laanan, Ministre de la Communauté française de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances

Eliane Tillieux, Ministre Wallon de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances

Benoît Cerexhe, Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune (COCOM), chargé de la Politique de la Santé et de la Fonction publique

Jean-Luc Vanraes, Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune (COCOM), chargé de la Politique de la Santé, des Finances, du Budget et des Relations extérieures

Harald Mollers, Ministre de la Communauté germanophone de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales

Ce projet est réalisé en collaboration avec:



**Direction générale Statistique
et Information économique**
WTCIII - Bd Simon Bolivar, 30 – 1000 Bruxelles



**Center for Statistics (CenStat)
Universiteit Hasselt**
Agoralaan 1 - 3590 Diepenbeek

© Institut Scientifique de Santé Publique, Bruxelles 2010.

Ce rapport ne peut être reproduit, publié ou distribué sans l'accord du WIV-ISP.



Table de matières

Introduction	5
Méthodologie	6
Résultats	13
Tableaux de base	14
Evolution au cours du temps	15
1. Etat de Santé	17
<i>Santé Subjective (SH)</i>	17
<i>Module MB/MA: Maladies chroniques (MB – MA)</i>	20
<i>Santé mentale (WB – SL – MH)</i>	31
<i>Limitations fonctionnelles (IL)</i>	49
<i>Douleurs physiques (PI)</i>	57
<i>Statut pondéral (NS)</i>	60
2. Style de Vie et Prévention	65
<i>Activité physique (PA)</i>	65
<i>Habitudes nutritionnelles (NH)</i>	70
<i>Consommation de tabac (TA)</i>	75
<i>Consommation d'alcool (AL)</i>	78
<i>Vaccination (VA)</i>	86
<i>Prévention cardiovasculaire (PR)</i>	91
3. Consommation de soins	97
<i>Contacts avec le médecin généraliste (GP)</i>	97
<i>Contacts avec le médecin spécialiste (SP)</i>	102
<i>Utilisation des services d'urgences (ED)</i>	107
<i>Contacts avec le dentiste (DC)</i>	110
<i>Consommation de médicaments (DR°)</i>	113
4. Santé et Société	119
<i>Santé et environnement (HE)</i>	119
<i>Santé sociale (SO)</i>	124





Introduction

En 2008, la Belgique a organisé la quatrième enquête de santé nationale. Les éditions précédentes ont eu lieu en 1997, 2001 et 2004. L'organisation de l'enquête de santé 2008 a été confiée à la direction opérationnelle Santé publique et Surveillance de l'Institut scientifique de Santé publique.

Pour ce qui est de la mise en œuvre concrète, un partenariat a été établi avec la Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) en ce qui concerne la collecte et la saisie des données. Pour le soutien statistique, on a fait appel au « Centrum voor Statistiek » (Censtat) de l'Université d'Hasselt (UHasselt).

La réalisation de l'enquête a été suivie par la Commission de commanditaires, au sein de laquelle chaque ministre compétent (au niveau fédéral, régional et communautaire) était représenté. Pour le soutien scientifique de l'enquête, on a pu faire appel à un conseil scientifique consultatif, avec des membres provenant des universités ou des professionnels actifs dans le domaine de la santé publique.

Une enquête de santé a pour objectif de collecter des informations relatives à l'état de santé de la population et aux besoins en matière de soins de santé qui ne sont pas disponibles ailleurs. Il s'agit donc d'un instrument contribuant explicitement à la politique sur le plan de la santé publique. L'enquête de santé permet d'étudier des thèmes relatifs à la santé choisis en fonction des objectifs généraux de la politique de santé publique et des recommandations internationales.

Bien que la Belgique dispose déjà de nombreuses informations en matière de santé, une enquête de santé permet d'apporter une plus-value considérable pour les raisons suivantes:

- Une enquête de santé donne un aperçu global de l'état de santé de l'ensemble de la population. En outre, cette estimation est faite selon le point de vue des personnes elles-mêmes;
- Les informations obtenues ont trait à la santé et aux styles de vie de l'ensemble de la population, y compris les personnes qui ne font pas appel aux services de santé;
- Une enquête de santé offre la possibilité d'établir un lien entre de nombreux facteurs liés à la santé;
- Le fait de répéter l'enquête de manière périodique permet de suivre les évolutions dans le temps.

Les thèmes qui ont été abordés dans l'enquête de santé 2008 sont subdivisés en quatre grands domaines:

- (1) l'état de santé,
- (2) les modes de vie et la prévention,
- (3) la consommation des soins,
- (4) la santé et société.



Méthodologie

Le cadre d'échantillonnage

L'enquête de santé s'adresse à toutes les personnes qui résident dans le pays, sans restriction de nationalité, d'âge ou de statut légal. Le cadre d'échantillonnage le plus complet pour atteindre cette population est le Registre National de Population. Les individus qui ne sont pas enregistrés au Registre National, comme les personnes "Sans Domicile Fixe" ou les immigrés clandestins, ne peuvent dès lors pas être sélectionnés pour participer à l'enquête.

Pour des raisons pragmatiques, certaines catégories de personnes sont également exclues de l'échantillon: celles qui résident (et sont domiciliées) en prison ou dans une communauté religieuse de plus de 8 personnes, ainsi que les personnes vivant en institution, à l'exception des maisons de repos ou les maisons de repos et de soins pour les personnes âgées. Ces dernières font bien partie de l'échantillon et représentent même un groupe auquel l'enquête porte un intérêt particulier.

La taille de l'échantillon

Sur base d'un protocole d'accord entre les divers commanditaires de l'enquête de santé, l'échantillon de base de l'enquête de santé 2008 doit normalement consister en 10.000 individus:

- 3.500 en Région flamande,
- 3.500 en Région wallonne (dont 241 en Communauté Germanophone),
- 3.000 en Région bruxelloise.

Ces nombres sont en principe suffisants pour des estimations précises tant au niveau national que régional.

Pour obtenir une bonne image de la santé des personnes âgées, le Service Public Fédéral (SPF) de la Sécurité Sociale a financé un échantillon supplémentaire de 1.250 personnes âgées, en veillant à ce qu'il représente suffisamment bien le groupe d'âge des 85 ans et plus.

Ceci signifie que la taille de l'échantillon prévu s'élevait à 11.250 unités pour l'enquête de santé 2008.

Composition de l'échantillon

Pour la composition de l'échantillon, différentes techniques ont été utilisées: la stratification, un sondage systématique à plusieurs degrés et la constitution de grappes. Un aperçu détaillé de ces techniques peut être retrouvé dans le protocole d'étude. On ne donnera donc ici qu'une brève description à ce sujet.

L'ensemble du processus de sélection se compose des étapes suivantes:

Stratification régionale:

Pour chacune des trois Régions du pays, le nombre de personnes à interroger a été déterminé au préalable et fixé à 3.500 personnes pour les Régions flamande et wallonne (avec un échantillon supplémentaire d'environ 450 personnes âgées) et 3.000 personnes pour la Région de Bruxelles-Capitale (avec un échantillon supplémentaire d'environ 350 personnes âgées).



Stratification provinciale:

Une stratification provinciale a été effectuée pour garantir une répartition géographique équilibrée de l'échantillon. Le nombre de personnes à sélectionner dans une province a été calculé en fonction de la taille (proportionnelle) de la population de cette province. En outre, un nombre fixe de personnes à interroger dans la Communauté Germanophone (géographiquement localisée dans la Province de Liège) est prédéterminé à 300. A cet effet, la Province de Liège a été scindée en deux strates: la Communauté Germanophone et le reste de la province.

Sélection des communes:

L'Enquête de Santé ne couvre pas à chaque fois toutes les communes de Belgique, mais uniquement un certain nombre d'entre elles. Le nombre de communes sélectionnées par province est basé sur la taille (nombre d'habitants) de la province et des communes/villes au sein de cette même province. La taille de la province détermine le nombre de *groupes* (de 50 personnes) qui doivent être sélectionnées. En tenant compte de leur taille, certaines communes ou villes seront sélectionnées avec certitude; s'il s'agit de très grandes villes, où plusieurs groupes (de 50 personnes) pourront être sélectionnés, tandis qu'une ou plusieurs plus petites communes le seront aussi, aléatoirement.

Sélection des ménages au sein des communes et des villes:

L'étape suivante correspond au choix des ménages dans chaque commune. Trois strates d'âge sont créées à cet effet: une strate avec les ménages qui comprennent au moins une personne de 85 ans ou plus, une strate avec les ménages qui comprennent au moins une personne de 75 ans ou plus mais aucune de 85 ans ou plus, une strate avec les ménages qui ne comprennent que des personnes âgées de moins de 75 ans.

En se basant sur les données démographiques d'enquêtes précédentes, un algorithme a été développé afin de procéder à la sélection (au hasard) des ménages dans chaque strate de telle façon qu'au sein de chaque groupe environ 55 personnes soient sélectionnées et comprennent chaque fois un certain nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus et de 85 ans ou plus.

Sélection des individus au sein des ménages:

Pour les ménages composés au maximum de 4 personnes, toutes sont sélectionnées pour participer à l'enquête. Pour les ménages de plus de 4 personnes, on sélectionne au maximum 4 personnes pour l'enquête. Pour cela, la règle suivante est utilisée. La personne de référence du ménage est toujours sélectionnée pour participer à l'enquête. Au cas où cette personne de référence a un/e partenaire au sein du ménage, il/elle sera également sélectionné(e) pour participer à l'enquête. Les autres membres du ménage, soit deux d'entre eux (dans le cas où la personne de référence a un/e partenaire au sein du ménage) ou trois d'entre eux (dans le cas où la personne de référence est sans partenaire) sont sélectionnés selon une technique aléatoire basée sur la règle des naissances: les 2 ou 3 personnes qui ont le plus rapidement leur anniversaire après la date de visite de l'enquêteur sont sélectionnées pour participer à l'enquête.



Remplacement des ménages:

Pour compenser le problème des ménages non-participants (refus, non-joignables), il a déjà été décidé en 1997 de remplacer ces ménages par des ménages de substitution. Les ménages de remplacement n'ont pas été choisis arbitrairement, mais possèdent une triade de caractéristiques en commun avec les ménages non-participants: ils sont localisés dans le même secteur statistique, ils ont une taille identique et les personnes de référence ont le même âge. Pour chaque ménage sélectionné dans l'échantillon de base, dès le début, trois ménages de remplacement sont aussi sélectionnés. On obtient donc des groupes de 4 ménages. On les appelle des "clusters" de ménages.

Si un ménage sélectionné refuse de participer à l'enquête ou ne peut être contacté (par exemple pour cause de déménagement dans une autre commune ou pour absence de longue durée), ce ménage est remplacé par le ménage suivant du même cluster. Cette procédure continue jusqu'à épuisement du cluster (de 4 ménages). Ensuite un nouveau cluster, qui n'a toutefois les plus mêmes caractéristiques (secteur statistique, âge de la personne de référence, taille du ménage), est activé. Pour ce nouveau cluster, une procédure identique de remplacement des ménages non-participants est appliquée.

Différentes parties (questionnaires) de l'enquête:

Une première partie consiste en une collecte d'un nombre de caractéristiques du ménage: sa composition, le revenu mensuel, les dépenses pour la santé, etc. On utilise pour cela un questionnaire qui est rempli au niveau du ménage via une interview orale menée en face à face avec l'enquêteur, le plus souvent avec la personne de référence du ménage.

Une deuxième partie consiste en une interview orale des membres sélectionnés du ménage. Dans certaines circonstances spécifiques, une personne (membre du ménage ou non) peut répondre 'au nom' de la personne sélectionnée (interview via proxy). Des thèmes tels que les affections chroniques, les limitations, le recours aux soins de santé... ont été pris en considération dans cette partie de l'enquête.

Une troisième partie consiste en un questionnaire à remplir par écrit par les personnes elles-mêmes et soumis à tous les membres sélectionnés âgés d'au moins 15 ans. La décision d'utiliser également un questionnaire par écrit est basé sur le fait que certains thèmes, tels que par exemple la santé mentale, la consommation d'alcool,... sont plus sensibles ou intimes et se prêtent donc moins à une interview en face à face avec un enquêteur.

Réalisation du travail de terrain:

Le travail de terrain de l'enquête s'est effectué entre le 19 mai 2008 et le 30 juin 2009. Pour l'exécution du travail de terrain, l'enquête de santé a fait appel à un réseau propre d'enquêteurs. Tous les enquêteurs ont été amenés à suivre une séance de formation spécifique, dont le but était de garantir une bonne standardisation des procédures à suivre lors des interviews auprès des ménages.



En bref, le travail de terrain se déroule comme suite:

Au début de chaque trimestre, une liste de noms et d'adresses des ménages à contacter est envoyée aux enquêteurs. À l'aide d'un *formulaire de communication*, l'enquêteur indique, entre autres, le nombre de tentatives de contact qu'il a entrepris avec chacun des ménages de sa liste. Lorsque l'enquêteur a pu réaliser une interview avec un ménage, il le signale comme "participant". Le formulaire de communication est à renvoyer au secrétariat de l'enquête tous les 14 jours au maximum, afin de remplacer les ménages non-participants par les ménages de remplacement. Sur base des informations transmises au moyen de ce formulaire, il est possible de suivre de près la progression du travail sur le terrain, et en cas de problème, de prendre des dispositions nécessaires.

Pour chaque ménage sélectionné (et donc pas seulement les ménages "participants"), un *formulaire de réception* doit être rempli par l'enquêteur qui en a la charge. A partir d'une série de questions concrètes, le statut précis de (non-)participation du ménage peut être établi. Pour les ménages participants, l'enquêteur y rapporte également le nombre de questionnaires (écrit et face à face) remplis par ménage.

Interview par proxy:

En principe, les personnes sélectionnées pour l'enquête doivent répondre elles-mêmes aux questions. Dans certains cas bien spécifiques, il est toutefois autorisé qu'une autre personne (membre du ménage ou non) réponde "au nom de" la personne sélectionnée. C'est ce que l'on appelle "utilisation d'un proxy". Attention, un proxy ne remplace pas la personne sélectionnée, il répond simplement pour cette personne, au nom de celle-ci.

L'utilisation d'un proxy est obligatoire pour toutes les personnes sélectionnées qui ont moins de 15 ans, pour les personnes gravement malades ou mentalement perturbées et aussi pour les personnes âgées qui vivent dans une institution, mais possèdent encore leur adresse officielle dans le ménage sélectionné.

Une interview par proxy est également autorisée lorsque la personne sélectionnée est absente pour une longue période (plus d'un mois). Enfin, une interview par proxy peut être utilisée dans le cas où la personne sélectionnée refuserait explicitement de participer à l'interview, mais accepte qu'un proxy réponde pour elle aux questions.

Un proxy peut, dans tous les cas cités ci-dessus, être utilisé pour répondre à la plupart des questions reprises dans le questionnaire face à face. Le proxy ne peut par contre en aucun cas répondre au questionnaire écrit à la place de la personne sélectionnée (questions trop personnelles).

Au total, 8.400 interviews (74,6%) ont été réalisées en interrogeant directement la personne sélectionnée. Dans 2.626 cas (23,3%), l'interview a été réalisée via un proxy faisant partie du ménage sélectionné. Dans 228 cas (2%), le proxy était une personne extérieure au ménage.

Contrôle de qualité:

Au cours de la période du travail de terrain, une procédure est prévue pour assurer un contrôle de qualité du travail des enquêteurs. Ce contrôle consiste à vérifier auprès des ménages la manière dont l'enquêteur a procédé pour réaliser les enquêtes. Tous les ménages qui ont effectivement participé à l'enquête entre le 1er septembre et le 1er décembre 2008 ont été sollicités pour le contrôle de qualité. Un questionnaire (limité à 8 questions) leur a été envoyé pour évaluer le professionnalisme de l'enquêteur. Sur les 1110 envois, 644 questionnaires sont rentrés (58%).



L'analyse des réponses a donné lieu à un rappel de certaines procédures pour l'ensemble des enquêteurs via la newsletter de l'enquête. Deux enquêteurs ont été contactés personnellement pour des erreurs systématiques, sans réelle conséquence sur la récolte des données.

Par ailleurs, avant d'entamer l'analyse des données récoltées, celles-ci sont soumises à des programmes de contrôle pour déterminer leur intégralité et leur cohérence interne. De plus, des fichiers de données différents (provenant des formulaires du travail de terrain, les données d'enquête,...) sont comparés afin de dégager les données incomplètes et/ou inconsistantes, qui sont ensuite contrôlées directement dans les questionnaires/formulaires et corrigées dans la base de données.

Enfin, un échantillon des données informatisées a fait l'objet d'un "double encodage" afin de déterminer le pourcentage d'erreurs qui peut être attribué aux personnes qui les introduisent dans la base de données. Les analyses ont démontré que ces pourcentages étaient relativement faibles.

Participation:

La participation à l'enquête de santé n'est pas obligatoire. Les ménages peuvent donc refuser de participer. Le statut de (non-)participation de chaque ménage sélectionné a été soigneusement inventorié. Ainsi, 14.549 ménages au total ont été invités à prendre part à l'enquête. Les taux de participation et de non-participation sont décrits dans le tableau ci-dessous:

Tableau 1: Statut définitif en ce qui concerne la participation des ménages invités, Enquête de Santé, Belgique 2008

	Nombre	Pourcentage
L'adresse n'existe pas	93	0,6
Le ménage ne réside pas à l'adresse mentionnée	2.328	16,0
Le ménage ne répond pas aux critères de sélection	111	0,8
Le ménage n'est pas joignable	1.462	10,1
Le ménage refuse de participer	4.746	32,6
Le ménage participe	5.809	39,9
Total	14.549	100,0

Le taux de participation est calculé sur base du nombre de ménages participants divisé par la somme du nombre de ménages participants et de ménages qui ont refusé de participer, soit: $5.809 / (5.809 + 4.746) = 55\%$. Ce taux est un peu plus bas que lors des enquêtes précédentes (1997: 59%, 2001: 61%, 2004: 61%). La comparaison des taux de participation est toutefois rendue compliquée par le fait que le présent échantillon comporte une surreprésentation des personnes âgées et très âgées (75 ans et plus).

Composition de la population d'étude (échantillon)

241 personnes résidant en Communauté Germanophone ont été interrogées.



Présentation des résultats de l'enquête

Les résultats de l'enquête de santé sont présentés dans ce rapport sous forme de toute une série d'indicateurs répartis en 4 chapitres.

Pondération:

Les résultats sont toujours pondérés pour correspondre le mieux possible à la population belge.

Comme lors des précédentes enquêtes, un plan d'échantillonnage assez complexe a été adopté: stratification régionale, stratification par âge, sur-échantillonnage des personnes âgées, interview de plusieurs personnes dans un même ménage, L'échantillon final est donc le fruit d'une longue préparation; il faut bien sût tenir compte de cette complexité dans l'analyse des données et la construction des indicateurs.

Le premier principe repose sur le choix au hasard de chaque personne sélectionnée et le fait que cette personne représente à elle seule un groupe de population qui partage des caractéristiques communes avec elle. Chaque personne sélectionnée par un échantillonnage aléatoire – par exemple un échantillon de 1% de la population – représente 100 individus faisant partie de cette population. En termes statistiques, il est considéré que cette personne a un poids de (ou un coefficient de pondération) de 100. Le poids est donc inversement proportionnel à la probabilité de sélection ($1/100 =$ probabilité de sélection, $100 =$ coefficient de pondération). A l'inverse, si au moment de constituer l'échantillon, il est décidé de sélectionner plus de personnes âgées que de jeunes, la probabilité de sélection des personnes âgées augmente et leur poids par rapport à la population réelle diminue.

Au moment de calculer une proportion ou une moyenne, il est nécessaire d'appliquer des facteurs de pondération spécifiques pour chaque participant à l'enquête afin de réaliser des inférences correctes au niveau de la population. Ce poids reflète donc la proportion de la population que ce participant représente. Les différents individus repris dans l'échantillon n'ont donc pas chacun le même poids. Ces poids spécifiques pour chacun d'entre eux, aussi bien au niveau individuel (variable *wfin*) qu'au niveau du ménage (variable *wfinhh*) sont calculés et appliqués lors de l'analyse.

Au cours du calcul des coefficients de pondération, différents aspects sont pris en compte (pour plus de détails, voir le protocole de l'enquête):

- La taille et la composition du ménage auquel le répondant appartient. Dans un ménage de 4 personnes ou moins, tous les membres du ménage sont sélectionnés. Pour chacun des membres du ménage la probabilité de sélection est de 1; chaque personne sélectionnée se représente elle-même au sein du ménage. Dans des ménages de plus de 4 personnes la probabilité de sélection est différente. Comme déjà mentionné, par définition, la personne de référence et son/sa partenaire sont sélectionnés d'office. Leur probabilité de sélection est donc de 1. Dans un ménage avec encore 3 autres personnes, la probabilité de sélection pour chacun des membres d'entre eux est de 2 (personnes à sélectionner) sur 3 (autres personnes) = 0.667. Ces deux personnes représentent en fait 3 personnes, et donc leur poids à chacune est 1,5 (ou $3/2 = 1,5$). La somme des poids de tous les membres du ménage est égale à la taille du ménage: 1 (personne de référence) + 1 (partenaire) + 2 (autres personnes sélectionnées) * 1,5 (poids) = 5.



Des informations additionnelles sont utilisées pour calculer le poids, de telle sorte que chaque personne qui a participé à l'enquête est un bon représentant de:

- sa classe d'âge (par classes de 5 ans) et de sexe au niveau provincial;
- la distribution en fonction de la taille du ménage et de l'âge de la personne de référence au niveau provincial. Lors du calcul des poids au niveau provincial, la stratification dans la constitution de l'échantillon est prise en compte;
- Afin de tenir compte des variations saisonnières potentielles d'une part, et du fait que le nombre d'interviews réalisées peut varier d'un trimestre à l'autre, le trimestre au cours duquel l'interview est réalisée est pris en compte dans le calcul du coefficient de pondération.



Résultats

La présentation des résultats pour chacun des indicateurs sélectionnés se fait de manière structurée:

Pour la Belgique:

Les résultats sont présentés au niveau de la Belgique dans son ensemble, mais aussi au niveau de chacune des provinces et pour la Communauté Germanophone.

Les résultats sont présentés sur base d'une série de caractéristiques socio-démographiques:

Age et sexe:

Les résultats sont présentés séparément pour les hommes et les femmes, d'une part, et en fonction de l'âge, d'autre part.

L'âge et le sexe sont souvent des déterminants importants en ce qui concerne les indicateurs de santé. Par ailleurs, pour pouvoir interpréter correctement des différences entre des groupes de population (par exemple, en fonction de la région de résidence, du degré d'urbanisation, du niveau d'éducation, ...), il est nécessaire de neutraliser l'effet de l'âge et du sexe. Ce faisant, il est possible de supprimer par exemple les différences entre les moins et les plus instruits qui seraient dues au fait qu'il y ait plus de personnes âgées au sein du groupe des personnes les moins instruites. Ceci pourrait en effet amener à une interprétation erronée: la différence mesurée ne reflète pas le lien entre l'indicateur (de santé) et le niveau d'instruction, mais bien le lien avec l'âge. Pour tenir compte de ce phénomène, on ne se contente pas d'interpréter et de présenter les résultats bruts (qui sont juste pondérés), mais aussi dans la plupart des cas, les différences après standardisation pour l'âge et le sexe.

Autres caractéristiques socio-démographiques:

Le niveau d'éducation: toutes les données sont analysées en fonction du niveau d'éducation. Ce dernier est utilisé comme indicateur du niveau socio-économique pour le ménage et les membres qui le composent. Cet indicateur est construit sur base du plus haut niveau d'éducation atteint soit par la personne de référence, soit par son/sa partenaire. Ce niveau d'éducation est alors attribué à l'ensemble des membres du ménage.

Evolution au cours du temps:

Des questions identiques aux éditions précédentes ont été utilisées pour certaines parties de l'enquête de santé 2008; il est possible dans ce cas de comparer les résultats dans le temps.



Tableaux de base

Les tableaux de base présentés dans ce rapport reprennent les résultats bruts (pondérés), que ce soit sous forme de proportions ou de moyennes, ainsi que les résultats standardisés, pour l'ensemble des indicateurs étudiés. Pour chacun d'eux, un premier tableau est présenté avec les résultats pour la Belgique dans son ensemble, puis un tableau supplémentaire est disponible avec les résultats concernant le même indicateur, mais cette fois pour la Communauté Germanophone.

La présentation des indicateurs est faite en fonction de toute une série de variables de base: sexe, groupes d'âge, niveau d'éducation et province de résidence. Si l'indicateur peut être calculé pour les enquêtes précédentes, les résultats sont alors aussi présentés pour chacune des années où c'est possible.

Les résultats sont chaque fois présentés aussi bien avec des taux bruts que des taux standardisés. Les taux bruts (pondérés) correspondent à la situation réelle. Cette information est seulement descriptive et doit être interprétée avec prudence quand on commence à faire des comparaisons. Ainsi, une différence entre la Communauté Germanophone et le reste de la province de Liège pour un indicateur de santé donné pourrait, par exemple, s'expliquer par le fait qu'il y a plus de personnes âgées dans la province de Liège. C'est la raison pour laquelle les taux standardisés sont aussi présentés dans les tableaux de base; ces derniers permettent de comparer des groupes de population après standardisation pour l'âge et le sexe. Il peut arriver alors que des différences observées au niveau des taux bruts disparaissent lorsque l'on observe les taux standardisés. Ceci est dû au fait que ces différences étaient quasi exclusivement dues aux variations concernant la distribution par âge et par sexe entre les deux groupes de population qui faisaient l'objet de la comparaison.

Les résultats au niveau des tableaux de base sont chaque fois présentés avec un intervalle de confiance (de 95%) et ce, aussi bien pour les taux bruts que pour les taux standardisés. Ces intervalles sont les valeurs limites entre lesquelles il y a 95% de chance que la valeur réelle de l'indicateur s'y retrouve (si l'on prenait autant de fois que possible un échantillon de la même population et que l'on calculait chaque fois ce même indicateur). L'intervalle de confiance donne une idée sur le niveau d'incertitude concernant le résultat; il permet aussi de se faire une première opinion sur les différences entre deux groupes de population et le fait de savoir si ces différences sont peut être statistiquement significatives. On peut en effet dire qu'il y a des chances que la différence entre deux groupes de population soit statistiquement significative pour un indicateur donné si les intervalles de confiance pour cet indicateur, calculés pour chacun des deux groupes, ne se chevauchent pas. Inversement, si ces intervalles se chevauchent, il est plus difficile de tirer une conclusion probante. Dans les deux cas, il est préférable de réaliser un test statistique pour vérifier si la différence entre les deux groupes est significative.



Evolution au cours du temps

Les enquêtes de santé fournissent des indications précieuses sur l'état de santé de la population belge et cela à quatre moments différents: 1997, 2001, 2004 et 2008. Il est donc possible de faire non seulement des comparaisons pour une année donnée mais également entre les différentes années (évolution au cours du temps). Cependant, étant donnée la nature transversale des données, l'étude de l'évolution au cours du temps n'est possible qu'avec des données agrégées et non pas au niveau individuel.

De possibles différences entre deux périodes de temps (par exemple entre 2004 et 2008) peuvent être attribuées à des changements dans la structure de la population. On se réfère ici à l'apparition toujours plus fréquente de maladies liées à l'âge suite au vieillissement de la population. C'est pourquoi, pour étudier les évolutions au cours du temps, on a tenu compte des changements de la population en termes d'âge et de sexe. D'une part, on a étudié les changements dans le temps pour la Belgique dans son ensemble. D'autre part, on a examiné pour ces évolutions au cours du temps s'il y avait des variations entre les différents sous-groupes de population. Par exemple, les changements observés au fil du temps sont-ils les mêmes pour les hommes que pour les femmes? Y a-t-il des différences de tendance entre les trois régions?

On a réalisé des régressions logistiques pour contrôler la signification statistique des indicateurs binaires. L'âge et le sexe ont été rajoutés au modèle comme variables explicatives pour tenir compte des changements de structure de la population. Les différences de tendance entre les sous-groupes de population (par exemple entre hommes et femmes) ont ainsi été étudiées en termes d'interaction avec le temps.

Attention, toutes ces analyses et leurs résultats doivent être interprétés dans le cas de la Communauté Germanophone avec la plus grande prudence en raison du petit nombre de personnes interrogées ! Il se peut notamment qu'un test statistique ne mette pas évidence des différences (entre hommes et femmes par exemple) qui existent mais que l'on ne peut pas prouver à cause du petit nombre de cas.





1. Etat de Santé

Santé Subjective (SH)

En Communauté Germanophone en 2008, 28% des personnes âgées de 15 ans et plus déclarent ne pas être satisfaites de leur état de santé.

Il n'y a pas de différences à ce sujet entre les hommes et les femmes. Par contre, ce pourcentage augmente avec l'âge pour atteindre plus de 53% chez les 65 ans ou plus.

Ce taux ne varie pas de manière significative en fonction du niveau d'éducation.

Le pourcentage de personnes âgées de 15 ans et plus en Communauté Germanophone qui déclarent ne pas être satisfaites de leur état de santé:

- n'est pas significativement différent de celui observé dans les différentes provinces belges.
- n'a pas varié de manière significative au cours des dix dernières années (de 22% en 1997 à 23% en 2008).



Pourcentage de la population (âgée de 15 ans et plus) avec une mauvaise (très mauvaise à moyenne) santé subjective, Enquête de santé 2008 - Belgique

	SH01_2	Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	20,5	(18,7-22,3)	17,7	(16,1-19,5)	3518
	Femme	25,7	(23,9-27,6)	21,9	(20,0-23,9)	4138
GROUPE D'AGE	15 - 24	6,5	(4,4-8,6)	6,5	(4,7-8,9)	908
	25 - 44	13,7	(11,8-15,7)	13,6	(11,8-15,6)	2360
	45 - 64	27,6	(25,1-30,1)	27,5	(25,0-30,1)	2362
	65 +	43,5	(40,1-46,8)	43,1	(39,7-46,5)	2026
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	42,7	(37,9-47,5)	30,3	(25,8-35,1)	971
	Secondaire inférieur	35,1	(31,0-39,1)	27,1	(23,4-31,1)	1226
	Secondaire supérieur	22,1	(19,9-24,4)	20,2	(18,2-22,5)	2372
	Enseignement supérieur	14,3	(12,4-16,3)	13,8	(12,0-15,9)	2908
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	23,9	(20,1-27,8)	20,4	(17,1-24,1)	900
	Brabant Flamand	21,9	(16,7-27,0)	17,5	(13,1-22,9)	513
	Flandre Occidentale	18,6	(14,4-22,8)	14,6	(11,6-18,2)	585
	Flandre Orientale	22,0	(17,8-26,1)	18,2	(14,7-22,3)	579
	Limbourg	18,3	(13,8-22,9)	15,5	(11,8-20,2)	433
	Bruxelles	25,7	(23,5-28,0)	24,6	(22,2-27,2)	1952
	Brabant Wallon	17,8	(11,1-24,4)	14,0	(9,3-20,4)	242
	Hainaut	30,3	(26,8-33,8)	26,7	(23,4-30,3)	968
	Liège	24,0	(19,9-28,1)	20,2	(16,7-24,1)	676
	Luxembourg	19,4	(13,4-25,3)	17,3	(12,5-23,4)	239
	Namur	29,3	(23,2-35,4)	25,5	(20,4-31,4)	383
	Communauté Germanophone	27,8	(20,1-35,4)	20,9	(15,5-27,6)	186
ANNEE D'ENQUETE	1997	21,7	(20,3-23,1)	21,8	(20,4-23,3)	7949
	2001	23,8	(22,5-25,0)	21,2	(20,0-22,4)	9366
	2004	23,1	(21,8-24,3)	20,3	(19,1-21,6)	9423
	2008	23,3	(21,9-24,6)	19,9	(18,6-21,2)	7656

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Pourcentage de la population (âgée de 15 ans et plus) avec une mauvaise (très mauvaise à moyenne) santé subjective, Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone

SH01_2		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	28,0	(15,9-40,2)	22,8	(12,2-38,5)	80
	Femme	27,6	(18,1-37,0)	23,2	(15,3-33,5)	106
GROUPE D'AGE	15 - 24	10,6	(0,0-25,6)	10,5	(2,6-34,1)	23
	25 - 44	14,7	(2,8-26,6)	14,7	(6,4-30,3)	37
	45 - 64	23,5	(11,7-35,3)	23,5	(13,9-36,8)	55
	65 +	52,7	(38,3-67,1)	52,6	(38,7-66,1)	71
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	40,5	(19,4-61,6)	22,8	(10,9-41,5)	48
	Secondaire inférieur	27,0	(10,4-43,7)	19,1	(9,2-35,4)	47
	Secondaire supérieur	30,2	(15,1-45,4)	34,8	(18,2-56,2)	38
	Enseignement supérieur	17,0	(2,0-32,0)	14,9	(5,8-33,2)	37
ANNEE D'ENQUETE	1997	17,1	(11,3-22,9)	18,5	(13,0-25,6)	239
	2001	25,1	(17,8-32,4)	21,5	(15,9-28,4)	222
	2004	20,6	(14,0-27,2)	17,4	(11,4-25,6)	194
	2008	27,8	(20,1-35,4)	20,8	(14,7-28,5)	186

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Maladies chroniques (MB – MA)

La prévalence des maladies chroniques a été étudiée tout d'abord de manière générale (présence d'une ou plusieurs maladies de longue durée ou de handicap - MB) mais aussi en ce qui concerne quelques pathologies spécifiques (MA):

- hypertension artérielle
- arthrose
- problème au niveau du bas du dos
- allergie

31% de la population en Communauté Germanophone déclare avoir souffert au cours des douze derniers mois d'une ou plusieurs maladies de longue durée ou de handicap; en ce qui concerne quelques pathologies spécifiques, la prévalence se distribue de la façon suivante:

- hypertension artérielle: 12%
- arthrose: 17%
- problème au niveau du bas du dos: 18%
- allergie: 13%

Ces prévalences ne varient pas de manière significative entre les hommes et les femmes. On observe par contre une augmentation avec l'âge, sauf en ce qui concerne les problèmes d'allergie.

La prévalence des maladies chroniques ne varie pas ici de manière significative en fonction du niveau d'éducation, sauf en ce qui concerne l'hypertension artérielle: la prévalence est plus élevée parmi les personnes qui ont au maximum un diplôme de l'enseignement primaire par rapport à celles qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur.

On n'observe pas de différence en terme de prévalence des maladies chroniques entre la Communauté Germanophone et les provinces belges, sauf à nouveau en ce qui concerne l'hypertension artérielle: la prévalence est plus basse en Communauté Germanophone par rapport au reste de la Province de Liège (14,5%) mais aussi en comparaison avec les taux observés en Flandre Occidentale et dans le Hainaut.

Pour terminer, l'évolution de la fréquence des maladies chroniques au cours des dix dernières années (1997 à 2008) a été contrôlée. On a observé au cours de cette période une augmentation linéaire en Communauté Germanophone de la prévalence tant en ce qui concerne les maladies chroniques en général mais aussi pour deux maladies spécifiques: l'hypertension et l'arthrose. Cette évolution n'est pas toutefois significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

La prévalence des problèmes d'allergie est quant à elle restée stable au cours de la période étudiée. Enfin, en ce qui concerne les problèmes lombaires, l'évaluation n'a pu être faite en raison des modifications apportées au questionnaire de l'enquête entre 2004 et 2008.



Pourcentage de la population avec une ou plusieurs maladies de longue durée, d'affections de longue durée ou de handicaps, Enquête de santé 2008 - Belgique

MB01_1		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	26,5	(24,8-28,1)	24,0	(22,3-25,8)	5223
	Femme	28,7	(27,0-30,3)	24,4	(22,7-26,2)	5997
GROUPE D'AGE	0 - 24	10,2	(8,6-11,7)	10,2	(8,7-11,8)	2807
	25 - 44	21,3	(19,2-23,3)	21,3	(19,3-23,4)	2836
	45 - 64	36,6	(34,2-39,0)	36,6	(34,2-39,0)	2736
	65 +	54,1	(51,1-57,0)	54,0	(51,1-56,9)	2841
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	44,2	(39,9-48,5)	30,2	(26,4-34,4)	1537
	Secondaire inférieur	40,3	(36,6-44,0)	31,9	(28,4-35,5)	1727
	Secondaire supérieur	25,1	(23,0-27,2)	23,2	(21,1-25,4)	3396
	Enseignement supérieur	20,4	(18,6-22,2)	20,7	(18,9-22,6)	4213
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	32,0	(28,3-35,8)	28,5	(25,0-32,3)	1187
	Brabant Flamand	24,5	(20,0-29,0)	20,3	(16,4-24,8)	635
	Flandre Occidentale	23,9	(19,7-28,0)	18,9	(15,6-22,8)	754
	Flandre Orientale	26,3	(22,4-30,2)	22,0	(18,5-25,9)	761
	Limbourg	21,8	(17,0-26,6)	18,2	(14,6-22,5)	547
	Bruxelles	30,5	(28,6-32,5)	29,6	(27,6-31,6)	3338
	Brabant Wallon	28,4	(21,9-34,9)	26,0	(19,9-33,2)	379
	Hainaut	27,5	(24,7-30,4)	24,5	(21,8-27,3)	1543
	Liège	33,4	(29,1-37,7)	30,5	(26,6-34,7)	885
	Luxembourg	21,3	(15,8-26,8)	19,9	(15,1-25,6)	358
	Namur	22,7	(17,7-27,7)	19,7	(15,8-24,3)	593
	Communauté Germanophone	30,8	(23,3-38,4)	24,6	(19,1-31,2)	240
ANNEE D'ENQUETE	1997	24,6	(23,2-25,9)	23,8	(22,5-25,2)	10203
	2001	25,3	(24,1-26,4)	22,7	(21,5-23,8)	12038
	2004	23,8	(22,6-25,0)	21,1	(19,9-22,4)	12906
	2008	27,6	(26,3-28,9)	24,5	(23,2-25,7)	11220

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) – Population totale



Pourcentage de la population avec une ou plusieurs maladies de longue durée, d'affections de longue durée ou de handicaps, Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone

MB01_1		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	32,7	(20,9-44,5)	27,9	(16,9-42,3)	106
	Femme	29,4	(21,0-37,9)	19,5	(12,4-29,3)	134
GROUPE D'AGE	0 - 24	3,5	(0,0-7,4)	3,5	(1,2-9,8)	55
	25 - 44	27,5	(14,9-40,2)	27,7	(17,4-40,9)	42
	45 - 64	33,0	(18,7-47,2)	33,3	(21,0-48,6)	57
	65 +	66,2	(53,7-78,7)	67,3	(54,2-78,1)	86
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	59,7	(36,3-83,1)	31,6	(14,0-56,6)	56
	Secondaire inférieur	29,6	(13,2-46,1)	16,9	(8,0-32,3)	56
	Secondaire supérieur	22,1	(10,8-33,3)	23,5	(12,8-39,2)	54
	Enseignement supérieur	17,6	(3,5-31,6)	11,1	(3,3-31,0)	48
ANNEE D'ENQUETE	1997	19,9	(14,8-25,0)	20,4	(15,8-26,0)	297
	2001	29,5	(22,1-36,9)	28,7	(21,7-37,0)	290
	2004	27,4	(20,0-34,9)	26,3	(19,1-35,0)	271
	2008	30,8	(23,3-38,4)	26,8	(20,9-33,7)	240

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population totale



Pourcentage de la population avec hypertension artérielle au cours des 12 derniers mois,
Enquête de santé 2008 - Belgique

MA05_3		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	11,1	(10,0-12,3)	2,9	(2,1-4,1)	5179
	Femme	14,7	(13,5-15,9)	3,7	(2,6-5,2)	5943
GROUPE D'AGE	0 - 24	0,5	(0,2-0,8)	0,5	(0,3-0,9)	2802
	25 - 44	5,2	(4,3-6,2)	5,2	(4,3-6,3)	2822
	45 - 64	19,9	(18,0-21,8)	19,9	(18,0-21,8)	2700
	65 +	36,7	(33,7-39,7)	36,3	(33,3-39,4)	2798
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	24,7	(21,4-28,0)	3,9	(2,6-5,6)	1508
	Secondaire inférieur	19,8	(16,4-23,2)	3,9	(2,6-5,7)	1712
	Secondaire supérieur	12,7	(11,2-14,2)	3,7	(2,6-5,2)	3375
	Enseignement supérieur	7,7	(6,7-8,8)	2,6	(1,8-3,7)	4178
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	13,1	(10,2-16,0)	3,3	(2,2-4,9)	1174
	Brabant Flamand	12,9	(9,8-16,1)	3,1	(2,0-4,8)	633
	Flandre Occidentale	15,9	(12,5-19,3)	3,8	(2,5-5,6)	745
	Flandre Orientale	10,6	(8,1-13,2)	2,4	(1,6-3,6)	753
	Limbourg	11,9	(8,5-15,3)	2,9	(1,9-4,5)	541
	Bruxelles	11,0	(9,8-12,2)	3,2	(2,2-4,5)	3301
	Brabant Wallon	13,5	(8,8-18,2)	3,8	(2,3-6,2)	374
	Hainaut	14,7	(12,6-16,8)	4,0	(2,8-5,8)	1531
	Liège	14,5	(11,6-17,4)	3,9	(2,6-5,8)	881
	Luxembourg	10,5	(6,5-14,5)	3,1	(1,8-5,3)	358
	Namur	11,3	(8,6-13,9)	2,9	(1,9-4,5)	592
	Communauté Germanophone	12,4	(7,6-17,2)	2,4	(1,4-4,1)	239
ANNEE D'ENQUETE	1997	9,2	(8,4-10,0)	3,9	(3,2-4,9)	10196
	2001	11,6	(10,7-12,5)	4,4	(3,6-5,5)	11994
	2004	12,3	(11,5-13,1)	4,8	(3,8-5,9)	12842
	2008	13,0	(12,0-13,9)	4,9	(4,0-6,0)	11122

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence)



**Pourcentage de la population avec hypertension artérielle au cours des 12 derniers mois,
Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone**

MA05_3		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	11,0	(4,9-17,1)	0,1	(0,0-0,1)	106
	Femme	13,4	(7,2-19,6)	0,1	(0,0-0,1)	133
GROUPE D'AGE	0 - 24	3,0	(0,0-8,4)	3,0	(0,5-15,2)	55
	25 - 44	2,2	(0,0-5,8)	2,2	(0,5-9,7)	41
	45 - 64	7,7	(0,4-14,9)	7,6	(3,0-18,2)	57
	65 +	38,9	(26,6-51,3)	38,7	(27,6-51,1)	86
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	33,4	(15,6-51,1)	0,1	(0,0-0,3)	54
	Secondaire inférieur	15,4	(4,6-26,2)	0,1	(0,0-0,2)	57
	Secondaire supérieur	5,8	(0,0-12,6)	0,1	(0,0-0,2)	54
	Enseignement supérieur	2,3	(0,0-6,2)	0,0	(0,0-0,1)	48
ANNEE D'ENQUETE	1997	6,9	(3,7-10,2)	0,5	(0,3-0,9)	297
	2001	10,9	(6,2-15,7)	0,7	(0,4-1,1)	293
	2004	14,2	(9,2-19,2)	0,9	(0,5-1,5)	270
	2008	12,4	(7,6-17,2)	0,6	(0,3-0,9)	239

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence)



Pourcentage de la population avec arthrose au cours des 12 derniers mois,
Enquête de santé 2008 - Belgique

MA08_3		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	8,5	(7,4-9,6)	0,4	(0,3-0,5)	5146
	Femme	17,4	(16,1-18,7)	0,9	(0,8-1,0)	5882
GROUPE D'AGE	0 - 24	0,3	(0,1-0,4)	0,2	(0,1-0,5)	2805
	25 - 44	4,4	(3,4-5,4)	4,1	(3,3-5,2)	2822
	45 - 64	19,5	(17,6-21,4)	18,8	(16,9-20,8)	2685
	65 +	40,7	(37,7-43,7)	38,9	(35,8-42,2)	2716
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	29,7	(26,1-33,4)	0,9	(0,7-1,1)	1486
	Secondaire inférieur	20,2	(16,8-23,5)	0,7	(0,6-0,9)	1684
	Secondaire supérieur	11,4	(9,9-12,8)	0,6	(0,5-0,7)	3349
	Enseignement supérieur	7,7	(6,6-8,8)	0,5	(0,4-0,6)	4169
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	13,3	(10,5-16,2)	0,6	(0,5-0,8)	1159
	Brabant Flamand	11,6	(8,7-14,6)	0,5	(0,3-0,6)	625
	Flandre Occidentale	12,3	(9,2-15,4)	0,5	(0,3-0,6)	728
	Flandre Orientale	13,0	(10,0-16,0)	0,5	(0,4-0,7)	744
	Limbourg	11,5	(8,4-14,7)	0,5	(0,3-0,7)	542
	Bruxelles	10,6	(9,4-11,8)	0,5	(0,4-0,6)	3288
	Brabant Wallon	13,2	(8,5-17,9)	0,6	(0,4-0,9)	377
	Hainaut	13,6	(11,4-15,7)	0,6	(0,5-0,8)	1513
	Liège	17,0	(13,9-20,2)	0,9	(0,7-1,1)	874
	Luxembourg	9,8	(6,4-13,2)	0,5	(0,3-0,8)	355
	Namur	17,1	(13,0-21,1)	0,9	(0,6-1,3)	590
	Communauté Germanophone	17,2	(10,7-23,7)	0,6	(0,4-0,9)	233
ANNEE D'ENQUETE	1997	10,1	(9,2-11,1)	3,4	(2,7-4,2)	10194
	2001	11,9	(11,0-12,8)	3,3	(2,7-4,1)	11998
	2004	10,3	(9,6-11,1)	2,8	(2,3-3,4)	12816
	2008	13,1	(12,1-14,0)	3,7	(3,0-4,5)	11028

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence)



Pourcentage de la population avec arthrose au cours des 12 derniers mois,
Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone

MA08_3		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	10,8	(3,7-17,9)	0,0	(0,0-0,0)	101
	Femme	21,8	(12,9-30,7)	0,0	(0,0-0,0)	132
GROUPE D'AGE	0 - 24	0,0		0,0	(0,0-0,0)	55
	25 - 44	0,0		0,0	(0,0-0,0)	42
	45 - 64	23,8	(9,4-38,2)	21,6	(10,9-38,4)	52
	65 +	45,8	(33,1-58,4)	43,1	(32,1-54,7)	84
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	35,5	(15,8-55,2)	0,0	(0,0-0,0)	55
	Secondaire inférieur	16,2	(3,6-28,8)	0,0	(0,0-0,0)	54
	Secondaire supérieur	8,9	(0,0-19,1)	0,0	(0,0-0,0)	52
	Enseignement supérieur	17,7	(1,2-34,3)	0,0	(0,0-0,0)	46
ANNEE D'ENQUETE	1997	8,2	(4,9-11,5)	0,1	(0,0-0,1)	297
	2001	12,1	(6,8-17,4)	0,1	(0,1-0,1)	293
	2004	10,9	(6,0-15,9)	0,1	(0,0-0,1)	269
	2008	17,2	(10,7-23,7)	0,1	(0,1-0,2)	233

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence)



Pourcentage de la population avec une affection du bas du dos au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2008 - Belgique

MA09_3		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	14,5	(13,2-15,8)	8,7	(7,0-10,7)	5118
	Femme	19,2	(17,7-20,6)	11,3	(9,2-13,9)	5888
GROUPE D'AGE	0 - 24	3,4	(2,5-4,2)	3,3	(2,6-4,3)	2797
	25 - 44	15,5	(13,8-17,3)	15,5	(13,8-17,3)	2798
	45 - 64	24,6	(22,4-26,8)	24,6	(22,5-26,8)	2662
	65 +	31,4	(28,3-34,4)	30,8	(27,8-34,0)	2749
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	28,7	(25,2-32,1)	14,3	(11,2-18,1)	1491
	Secondaire inférieur	23,7	(20,1-27,2)	12,5	(9,7-15,9)	1692
	Secondaire supérieur	15,8	(14,2-17,5)	9,8	(7,8-12,2)	3333
	Enseignement supérieur	12,5	(11,1-13,9)	8,3	(6,6-10,5)	4148
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	17,4	(14,3-20,4)	10,1	(7,7-13,1)	1157
	Brabant Flamand	19,8	(15,9-23,6)	11,7	(8,4-16,0)	618
	Flandre Occidentale	19,8	(16,4-23,1)	11,3	(8,7-14,7)	732
	Flandre Orientale	19,7	(16,2-23,3)	11,6	(8,9-15,2)	742
	Limbourg	12,3	(8,7-15,9)	6,8	(4,6-9,8)	536
	Bruxelles	15,2	(13,7-16,7)	9,5	(7,6-11,8)	3277
	Brabant Wallon	13,3	(9,1-17,5)	7,9	(5,3-11,6)	376
	Hainaut	14,6	(12,4-16,7)	8,5	(6,6-10,9)	1518
	Liège	15,9	(12,5-19,3)	9,3	(6,9-12,5)	865
	Luxembourg	15,1	(10,5-19,7)	10,1	(7,2-14,0)	356
	Namur	18,2	(14,2-22,2)	11,2	(8,2-15,1)	591
Communauté Germanophone	17,7	(11,1-24,4)	9,3	(6,0-14,2)	238	
ANNEE D'ENQUETE	2008	16,9	(15,9-17,9)	10,2	(9,1-11,4)	11006

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence)



Pourcentage de la population avec une affection du bas du dos au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone

MA09_3		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	14,7	(6,8-22,6)	1,0	(0,5-2,0)	106
	Femme	20,0	(12,2-27,8)	1,3	(0,8-2,1)	132
GROUPE D'AGE	0 - 24	6,1	(0,0-12,9)	6,0	(2,0-16,6)	53
	25 - 44	12,6	(1,1-24,0)	12,3	(4,9-27,9)	42
	45 - 64	17,0	(6,9-27,0)	16,7	(9,0-28,7)	57
	65 +	37,9	(20,3-55,5)	37,1	(22,0-55,1)	86
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	20,0	(4,8-35,2)	0,0	(0,0-0,1)	54
	Secondaire inférieur	25,1	(4,5-45,7)	0,1	(0,1-0,3)	57
	Secondaire supérieur	11,1	(1,0-21,2)	0,1	(0,0-0,3)	53
	Enseignement supérieur	11,6	(0,1-23,2)	0,1	(0,0-0,3)	48
ANNEE D'ENQUETE	2008	17,7	(11,1-24,4)	12,4	(8,1-18,5)	238

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence)



Pourcentage de la population avec allergie au cours des 12 derniers mois,
Enquête de santé 2008 - Belgique

MA12_3		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	11,5	(10,2-12,8)	11,3	(10,1-12,7)	5151
	Femme	14,3	(13,0-15,6)	14,4	(13,1-15,7)	5944
GROUPE D'AGE	0 - 24	12,6	(10,8-14,4)	12,6	(10,9-14,5)	2767
	25 - 44	16,9	(14,9-18,8)	16,8	(14,9-18,8)	2810
	45 - 64	11,1	(9,7-12,6)	11,1	(9,7-12,7)	2700
	65 +	10,1	(8,1-12,2)	9,9	(8,0-12,2)	2818
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	9,1	(6,9-11,3)	9,8	(7,5-12,7)	1525
	Secondaire inférieur	12,3	(9,7-15,0)	12,8	(10,3-15,8)	1708
	Secondaire supérieur	10,8	(9,3-12,3)	10,5	(9,1-12,0)	3373
	Enseignement supérieur	15,9	(14,2-17,7)	15,4	(13,7-17,2)	4149
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	15,0	(12,2-17,7)	14,8	(12,2-17,8)	1176
	Brabant Flamand	17,1	(11,5-22,7)	17,0	(12,2-23,3)	624
	Flandre Occidentale	11,5	(9,0-14,1)	11,6	(9,3-14,3)	750
	Flandre Orientale	11,1	(8,5-13,7)	11,0	(8,6-13,9)	753
	Limbourg	8,6	(5,0-12,3)	8,5	(5,5-12,8)	541
	Bruxelles	13,3	(11,9-14,6)	12,7	(11,4-14,1)	3285
	Brabant Wallon	16,2	(11,5-20,9)	16,2	(12,0-21,5)	373
	Hainaut	10,1	(8,4-11,8)	9,9	(8,4-11,7)	1534
	Liège	17,1	(13,9-20,3)	16,9	(13,9-20,3)	873
	Luxembourg	10,2	(6,4-13,9)	10,0	(6,9-14,2)	356
	Namur	11,5	(7,5-15,5)	11,3	(7,9-16,0)	591
	Communauté Germanophone	12,6	(6,8-18,4)	12,9	(8,1-20,1)	239
ANNEE D'ENQUETE	1997	12,9	(11,9-13,9)	12,3	(11,3-13,3)	10195
	2001	13,8	(12,9-14,7)	13,5	(12,6-14,4)	11978
	2004	13,3	(12,3-14,3)	13,1	(12,1-14,1)	12851
	2008	13,0	(12,0-14,0)	12,8	(11,9-13,8)	11095

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence)



**Pourcentage de la population avec allergie au cours des 12 derniers mois,
Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone**

MA12_3		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	8,8	(1,1-16,5)	9,2	(4,0-19,7)	107
	Femme	15,4	(8,4-22,4)	15,0	(9,0-23,8)	132
GROUPE D'AGE	0 - 24	9,0	(0,1-17,9)	8,4	(2,9-21,9)	55
	25 - 44	18,4	(5,2-31,6)	17,5	(8,4-32,8)	41
	45 - 64	19,5	(7,2-31,8)	18,3	(8,6-35,0)	57
	65 +	3,5	(0,0-8,0)	3,1	(0,8-11,1)	86
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	5,4	(0,0-12,3)	8,9	(2,0-32,0)	55
	Secondaire inférieur	22,1	(5,8-38,4)	21,9	(9,1-44,1)	57
	Secondaire supérieur	4,7	(0,0-10,9)	2,5	(0,7-8,7)	54
	Enseignement supérieur	15,6	(3,4-27,8)	14,3	(5,3-33,3)	47
ANNEE D'ENQUETE	1997	17,1	(12,0-22,1)	14,9	(10,8-20,3)	297
	2001	13,9	(8,8-19,0)	13,2	(9,2-18,7)	293
	2004	21,6	(14,0-29,3)	21,2	(14,6-29,7)	271
	2008	12,6	(6,8-18,4)	12,3	(7,7-19,1)	239

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence)



Santé mentale (WB – SL – MH)

Mal-être psychologique

En 2008, 17% des habitants de la Communauté Germanophone âgés de 15 ans et plus manifestent un mal-être psychologique, tel que mesuré par le "General Health Questionnaire" (au seuil de 2 et plus).

Contrairement à ce qui est observé dans la population totale, les femmes ne semblent pas ici significativement plus vulnérables à la détresse psychologique (16%) que les hommes (19%).

La proportion de personnes éprouvant un mal-être diminue avec l'âge: de 21% chez les jeunes de 15-24 ans à 12% chez les personnes de 65 ans et plus, mais la différence n'est pas significative.

On n'observe pas de gradient socio-économique: le taux de mal-être psychologique est juste plus élevé chez les personnes avec un niveau moyen (enseignement secondaire).

Le pourcentage de personnes âgées de 15 ans et plus qui manifestent un mal-être psychologique s'avère moins élevé en Communauté Germanophone que ceux obtenus dans les provinces d'Anvers mais aussi toutes les provinces wallonnes (27% à 32%) et à Bruxelles (34%).

En 2008, la prévalence du mal-être (17%) est quasiment au même niveau qu'en 1997 (15%), alors qu'en 2001 et 2004 les prévalences étaient plus élevées (30% et 27%, respectivement).

Troubles dépressifs

3,8% des habitants de la Communauté Germanophone âgés de 15 ans et plus semblent souffrir en 2008 de troubles dépressifs.

On n'observe pas de différences entre les femmes (4,5%) et les hommes (3%) à ce sujet. Les problèmes d'ordre dépressifs surviennent cependant plus communément chez les personnes d'âge moyen: surtout entre 25 et 44 ans (8%) et un peu moins de 45 à 64 ans (4%).

Les troubles dépressifs affectent en plus grande proportion les personnes avec un diplôme de l'enseignement supérieur: 7%, contre maximum 2% pour les niveaux d'éducation inférieurs.

Les taux observés en Communauté Germanophone sont moins élevés que les prévalences respectives des provinces de Anvers et de Flandre Orientale, mais aussi des provinces wallonnes (sauf le Luxembourg) et de Bruxelles (14%).

Ici aussi, la prévalence des troubles en 2008 (3,8%) tend à diminuer par rapport à 2004 (5,5%) pour retrouver des valeurs antérieures (3,4% en 2001), mais ces variations ne sont toutefois pas statistiquement significatives après standardisation pour l'âge et le sexe.



Troubles anxieux

1,7% des habitants de la Communauté Germanophone âgés de 15 ans et plus semblent souffrir de problèmes d'anxiété.

Les problèmes d'anxiété ne sont pas significativement plus fréquents chez les femmes (2,3%) que chez les hommes (0,9%). Vu les petits nombres de cas, il n'est pas prudent de tirer des conclusions quant à la distribution par âge ou par niveau d'éducation.

Les taux observés en Communauté Germanophone sont moins élevés que les prévalences respectives des provinces de Anvers et de Flandre Orientale, mais aussi des provinces wallonnes (sauf le Luxembourg) et de Bruxelles.

La prévalence des troubles anxieux est à son niveau le plus bas depuis qu'il est évalué dans les enquêtes de santé (2,8% en 2001; 4% en 2004) mais cette tendance n'est pas statistiquement significative.

Troubles du sommeil

16% des habitants de la Communauté Germanophone âgés de 15 ans et plus semble avoir des troubles du sommeil. Ces problèmes touchent les femmes et les hommes dans les mêmes proportions. Ils sont en revanche fortement liés à l'âge, passant de 1% chez les jeunes de 15 à 24 ans à 20% chez les séniors (65+).

Le taux mesuré en Communauté Germanophone est comparable à celui observé dans la plupart des provinces sauf en ce qui concerne les taux observés à Bruxelles (25%), dans le Hainaut (26%) ou à Namur (29%).

La prévalence des problèmes de sommeil est restée très stable en Communauté Germanophone depuis qu'elle est mesurée dans le cadre des enquêtes de santé (16% de 2001 à 2008).

Consommation de médicaments psychotropes

15% des habitants de la Communauté Germanophone rapporte avoir consommé des médicaments psychotropes au cours des 2 dernières semaines. Sans tenir compte de la poly consommation, ce sont les somnifères qui sont utilisés le plus souvent (13%), suivis des tranquillisants (7%) et des antidépresseurs (3%).

En général, la consommation de médicaments psychotropes s'avère beaucoup plus fréquente parmi les femmes (23%) que parmi les hommes (4,5%). Cette consommation augmente avec l'âge: pas de consommation chez les 15-24 ans (mais attention, l'échantillon est très petit, avec seulement 24 individus interrogés dans cette tranche d'âge) contre 4% à 9% des personnes de 25 à 64 ans et surtout 40% des personnes âgées de 65 ans et plus!

On observe également un usage plus important de médicaments psychotropes chez les personnes avec le niveau d'éducation le plus faible (26%) par rapport aux autres niveaux (10% à 15%), mais la différence n'est pas statistiquement significative.

La consommation de médicaments psychotropes en Communauté Germanophone s'avère équivalente à la prévalence observée dans l'ensemble des provinces (entre 12% et 19%), à l'exception de la province de Liège où elle est plus élevée (23%).

La consommation de médicaments psychotropes a augmenté de façon significative au cours des dix dernières années en Communauté Germanophone, avec une plus forte amplitude que ce qui est observé au niveau national. Le pourcentage a triplé au cours de la période, pour passer de 5% en 1997, à 6% en 2001, le double (12%) en 2004, et enfin 15% en 2008 !



Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) qui présente des difficultés psychologiques récentes (score GHQ au seuil 2+), Enquête de santé 2008 - Belgique

WB_2		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	21,7	(19,8-23,7)	21,7	(19,8-23,7)	3460
	Femme	29,9	(27,9-31,8)	30,0	(28,0-32,0)	4065
GROUPE D'AGE	15 - 24	29,1	(24,9-33,2)	29,0	(25,0-33,3)	903
	25 - 44	27,1	(24,6-29,5)	26,8	(24,3-29,3)	2330
	45 - 64	24,8	(22,4-27,1)	24,6	(22,3-27,0)	2334
	65 +	24,1	(21,1-27,0)	23,4	(20,6-26,5)	1958
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	29,4	(25,1-33,7)	30,7	(26,0-35,9)	935
	Secondaire inférieur	26,7	(22,8-30,5)	27,4	(23,6-31,6)	1196
	Secondaire supérieur	24,7	(22,3-27,2)	24,2	(21,8-26,7)	2329
	Enseignement supérieur	25,5	(23,0-28,0)	24,6	(22,3-27,2)	2887
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	26,2	(22,2-30,2)	25,9	(22,1-30,2)	888
	Brabant Flamand	23,1	(18,1-28,1)	22,7	(18,1-28,0)	509
	Flandre Occidentale	20,5	(16,4-24,6)	20,3	(16,4-24,7)	580
	Flandre Orientale	24,1	(18,9-29,4)	24,0	(19,2-29,6)	574
	Limbourg	21,4	(16,0-26,7)	21,1	(16,4-26,9)	428
	Bruxelles	34,3	(31,8-36,8)	33,7	(31,2-36,3)	1905
	Brabant Wallon	31,3	(23,1-39,6)	30,8	(23,3-39,4)	238
	Hainaut	28,7	(25,3-32,0)	28,3	(25,1-31,9)	953
	Liège	26,7	(22,5-30,9)	26,4	(22,5-30,8)	662
	Luxembourg	32,0	(24,5-39,5)	31,6	(24,7-39,4)	238
	Namur	32,0	(26,1-37,9)	31,5	(26,1-37,6)	370
	Communauté Germanophone	17,2	(10,1-24,3)	16,7	(10,7-25,0)	180
ANNEE D'ENQUETE	1997	31,1	(29,5-32,6)	30,7	(29,1-32,3)	8217
	2001	24,8	(23,6-26,1)	24,5	(23,2-25,8)	9211
	2004	24,5	(23,2-25,8)	24,2	(22,9-25,5)	9258
	2008	26,0	(24,5-27,5)	25,7	(24,2-27,2)	7525

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



**Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) qui présente des difficultés psychologiques récentes (score GHQ au seuil 2+),
Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone**

WB_2		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	19,4	(9,5-29,4)	16,3	(9,1-27,6)	77
	Femme	15,7	(7,1-24,2)	14,2	(7,7-24,6)	103
GROUPE D'AGE	15 - 24	21,1	(0,0-43,8)	21,8	(7,5-49,1)	23
	25 - 44	20,7	(6,8-34,7)	21,1	(10,7-37,3)	36
	45 - 64	17,1	(5,4-28,8)	17,2	(8,5-31,8)	53
	65 +	12,4	(4,3-20,5)	12,5	(6,4-22,8)	68
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	10,2	(0,5-19,9)	6,9	(1,8-22,6)	47
	Secondaire inférieur	21,1	(5,6-36,5)	18,5	(8,5-35,5)	45
	Secondaire supérieur	15,7	(0,0-31,8)	16,0	(5,7-37,7)	37
	Enseignement supérieur	8,6	(0,0-22,2)	5,7	(0,6-36,6)	36
ANNEE D'ENQUETE	1997	15,4	(9,6-21,1)	14,1	(9,4-20,5)	240
	2001	30,2	(21,7-38,7)	28,6	(21,4-37,1)	208
	2004	26,6	(18,0-35,1)	23,9	(16,8-32,9)	183
	2008	17,2	(10,1-24,3)	15,5	(9,8-23,5)	180

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) qui présente des symptômes récents d'un trouble dépressif (score au SCL-90R), Enquête de santé 2008 - Belgique

SL_2		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	5,9	(4,8-7,1)	5,7	(4,7-6,8)	3447
	Femme	12,8	(11,5-14,2)	12,2	(10,9-13,6)	4036
GROUPE D'AGE	15 - 24	5,3	(3,6-7,1)	5,0	(3,6-6,9)	911
	25 - 44	7,7	(6,4-9,0)	7,1	(6,0-8,5)	2336
	45 - 64	10,5	(8,9-12,1)	9,9	(8,5-11,6)	2318
	65 +	13,9	(11,3-16,6)	12,7	(10,2-15,7)	1918
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	14,6	(11,7-17,5)	11,6	(9,1-14,6)	927
	Secondaire inférieur	13,8	(10,6-17,0)	11,7	(9,1-15,1)	1182
	Secondaire supérieur	10,3	(8,7-11,8)	9,5	(8,1-11,1)	2320
	Enseignement supérieur	5,9	(4,8-7,0)	5,5	(4,5-6,7)	2877
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	10,1	(7,1-13,2)	9,0	(6,6-12,2)	884
	Brabant Flamand	6,1	(4,0-8,1)	5,1	(3,6-7,2)	506
	Flandre Occidentale	6,3	(4,1-8,6)	5,4	(3,8-7,8)	578
	Flandre Orientale	9,1	(6,6-11,7)	8,1	(6,1-10,7)	568
	Limbourg	7,7	(4,8-10,5)	6,9	(4,7-10,1)	424
	Bruxelles	13,8	(11,9-15,6)	12,9	(11,1-14,9)	1891
	Brabant Wallon	9,2	(4,6-13,7)	7,6	(4,6-12,4)	239
	Hainaut	12,7	(10,1-15,3)	11,2	(9,0-13,9)	955
	Liège	11,2	(8,5-14,0)	9,9	(7,6-12,8)	660
	Luxembourg	7,5	(3,6-11,4)	6,9	(4,1-11,6)	236
	Namur	8,9	(5,3-12,5)	7,8	(5,1-11,7)	363
	Communauté Germanophone	3,8	(1,0-6,5)	2,9	(1,4-6,1)	179
ANNEE D'ENQUETE	2001	8,6	(7,8-9,5)	8,1	(7,2-8,9)	9159
	2004	8,0	(7,2-8,7)	7,4	(6,7-8,1)	9241
	2008	9,5	(8,6-10,4)	8,8	(7,9-9,7)	7483

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



**Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) qui présente des symptômes récents d'un trouble dépressif (score au SCL-90R),
Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone**

SL_2		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	2,8	(0,0-6,9)		(0,0-0,1)	79
	Femme	4,5	(0,6-8,4)		(0,0-0,1)	100
GROUPE D'AGE	15 - 24	0,0				23
	25 - 44	8,0	(0,0-17,4)	7,4	(1,9-25,0)	37
	45 - 64	4,2	(0,0-9,2)	4,0	(1,2-12,0)	54
	65 +	2,0	(0,0-4,5)	1,9	(0,5-6,3)	65
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	2,4	(0,0-5,7)			44
	Secondaire inférieur	1,7	(0,0-5,3)			45
	Secondaire supérieur	0,0				37
	Enseignement supérieur	6,6	(0,0-15,8)			37
ANNEE D'ENQUETE	2001	3,4	(0,1-6,7)	0,2	(0,1-0,5)	209
	2004	5,5	(1,8-9,2)	0,4	(0,2-0,7)	183
	2008	3,8	(1,0-6,5)	0,2	(0,1-0,6)	179

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) qui présente des symptômes récents d'un trouble anxieux (score au SCL-90R), Enquête de santé 2008 - Belgique

SL_3		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	4,5	(3,4-5,5)	4,3	(3,4-5,4)	3441
	Femme	8,4	(7,2-9,5)	8,0	(7,0-9,3)	4020
GROUPE D'AGE	15 - 24	3,5	(2,2-4,8)	3,4	(2,3-4,9)	908
	25 - 44	6,1	(4,8-7,4)	5,8	(4,7-7,1)	2334
	45 - 64	7,2	(5,9-8,5)	6,9	(5,7-8,3)	2309
	65 +	8,1	(5,7-10,6)	7,5	(5,4-10,4)	1910
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	9,5	(7,1-12,0)	8,5	(6,3-11,3)	920
	Secondaire inférieur	9,3	(6,1-12,4)	8,3	(5,8-11,8)	1177
	Secondaire supérieur	6,5	(5,2-7,7)	6,0	(4,9-7,3)	2314
	Enseignement supérieur	4,5	(3,4-5,6)	4,2	(3,3-5,3)	2873
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	7,2	(4,3-10,0)	6,6	(4,4-9,7)	883
	Brabant Flamand	3,7	(2,0-5,4)	3,3	(2,1-5,2)	505
	Flandre Occidentale	4,1	(2,2-6,0)	3,7	(2,3-5,9)	576
	Flandre Orientale	7,5	(5,0-10,0)	6,9	(4,9-9,6)	565
	Limbourg	4,6	(2,3-7,0)	4,3	(2,6-7,1)	424
	Bruxelles	9,1	(7,6-10,7)	8,6	(7,2-10,3)	1887
	Brabant Wallon	5,7	(1,9-9,5)	4,9	(2,5-9,5)	236
	Hainaut	7,1	(5,3-8,9)	6,4	(4,9-8,3)	952
	Liège	8,4	(5,7-11,1)	7,6	(5,4-10,7)	659
	Luxembourg	4,3	(1,3-7,4)	4,1	(2,0-8,2)	234
	Namur	7,7	(4,2-11,2)	7,0	(4,4-10,9)	361
	Communauté Germanophone	1,7	(0,1-3,4)	1,4	(0,5-3,7)	179
ANNEE D'ENQUETE	2001	6,3	(5,6-7,0)	5,9	(5,3-6,6)	9148
	2004	6,1	(5,4-6,8)	5,7	(5,1-6,4)	9237
	2008	6,5	(5,7-7,3)	6,0	(5,3-6,9)	7461

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) qui présente des symptômes récents d'un trouble anxieux (score au SCL-90R), Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone

SL_3		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	0,9	(0,0-2,8)			78
	Femme	2,3	(0,0-4,8)			101
GROUPE D'AGE	15 - 24	0,0		0		23
	25 - 44	2,6	(0,0-8,0)	2,2	(0,3-13,1)	37
	45 - 64	1,1	(0,0-3,5)	1,0	(0,1-6,4)	54
	65 +	2,9	(0,0-6,5)	2,5	(0,5-12,0)	65
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	1,1	(0,0-3,5)			44
	Secondaire inférieur	3,6	(0,0-8,5)			45
	Secondaire supérieur	0,0		0		37
	Enseignement supérieur	0,0		0		37
ANNEE D'ENQUETE	2001	2,8	(0,6-4,9)	0,3	(0,1-0,6)	206
	2004	4,0	(0,7-7,2)	0,4	(0,2-0,9)	184
	2008	1,7	(0,1-3,4)	0,1	(0,0-0,4)	179

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) avec des symptômes récents d'un trouble du sommeil (score au SCL-90R), Enquête de santé 2008 - Belgique

SL_4		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	18,4	(16,7-20,0)	17,9	(16,3-19,6)	3422
	Femme	24,1	(22,3-25,8)	23,4	(21,6-25,2)	4004
GROUPE D'AGE	15 - 24	15,6	(12,5-18,6)	15,5	(12,7-18,8)	901
	25 - 44	17,3	(15,1-19,4)	17,1	(15,1-19,3)	2325
	45 - 64	24,3	(22,1-26,5)	24,2	(22,1-26,5)	2296
	65 +	27,4	(24,4-30,4)	26,9	(24,0-29,9)	1904
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	27,7	(23,7-31,6)	24,4	(20,6-28,7)	920
	Secondaire inférieur	31,4	(27,5-35,3)	29,2	(25,6-33,2)	1169
	Secondaire supérieur	21,2	(18,9-23,5)	20,9	(18,7-23,3)	2304
	Enseignement supérieur	16,3	(14,5-18,1)	16,4	(14,7-18,3)	2856
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	20,6	(17,4-23,7)	19,8	(16,9-23,1)	877
	Brabant Flamand	17,4	(12,8-22,0)	16,3	(12,3-21,3)	498
	Flandre Occidentale	20,5	(16,4-24,6)	19,4	(15,8-23,6)	576
	Flandre Orientale	20,6	(16,3-24,9)	19,7	(15,9-24,2)	565
	Limbourg	17,8	(13,5-22,1)	17,3	(13,5-21,8)	423
	Bruxelles	25,1	(22,7-27,5)	25,3	(22,9-27,8)	1872
	Brabant Wallon	17,5	(11,6-23,3)	16,3	(11,5-22,8)	236
	Hainaut	26,5	(23,2-29,7)	25,5	(22,4-28,9)	949
	Liège	21,0	(17,2-24,8)	20,1	(16,6-24,1)	659
	Luxembourg	19,8	(13,7-25,9)	19,9	(14,4-27,0)	232
	Namur	29,0	(23,3-34,7)	28,3	(22,9-34,4)	360
	Communauté Germanophone	15,6	(7,5-23,6)	14,0	(8,1-23,0)	179
ANNEE D'ENQUETE	2001	20,2	(19,1-21,4)	19,7	(18,6-20,9)	9156
	2004	19,9	(18,7-21,1)	19,2	(18,1-20,5)	9239
	2008	21,3	(20,0-22,6)	20,4	(19,1-21,7)	7426

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) avec des symptômes récents d'un trouble du sommeil (score au SCL-90R), Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone

SL_4		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	15,4	(4,6-26,2)	1,0	(0,4-2,4)	79
	Femme	15,7	(6,5-24,9)	1,2	(0,7-2,2)	100
GROUPE D'AGE	15 - 24	0,9	(0,0-2,5)	0,9	(0,2-4,4)	23
	25 - 44	14,6	(0,0-29,6)	14,4	(4,8-35,8)	37
	45 - 64	19,1	(5,4-32,8)	19,0	(9,0-35,7)	54
	65 +	20,0	(7,9-32,0)	19,9	(10,6-34,2)	65
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	16,2	(3,3-29,0)	1,5	(0,4-5,2)	44
	Secondaire inférieur	27,3	(4,1-50,6)	2,3	(0,7-7,8)	45
	Secondaire supérieur	6,5	(0,0-16,1)	0,5	(0,1-2,4)	37
	Enseignement supérieur	10,8	(0,0-26,7)	0,7	(0,2-2,5)	37
ANNEE D'ENQUETE	2001	16,3	(9,6-23,0)	13,3	(8,7-19,8)	207
	2004	15,6	(9,8-21,5)	12,0	(7,2-19,4)	186
	2008	15,6	(7,5-23,6)	11,2	(6,2-19,4)	179

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) qui déclare avoir pris des médicaments psychotropes au cours des 2 dernières semaines, Enquête de santé 2008 - Belgique

MH_14		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	10,5	(9,2-11,8)	8,2	(7,1-9,4)	4397
	Femme	20,9	(19,4-22,4)	16,3	(14,8-17,8)	5204
GROUPE D'AGE	15 - 24	3,3	(2,1-4,4)	3,1	(2,1-4,4)	1206
	25 - 44	8,0	(6,7-9,2)	7,6	(6,4-8,9)	2832
	45 - 64	18,9	(16,9-20,8)	18,3	(16,4-20,3)	2722
	65 +	32,9	(30,1-35,7)	31,0	(28,1-33,9)	2841
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	28,2	(24,9-31,6)	15,4	(12,9-18,3)	1451
	Secondaire inférieur	23,9	(20,4-27,4)	15,8	(13,2-18,8)	1546
	Secondaire supérieur	13,5	(11,9-15,2)	11,0	(9,6-12,6)	2866
	Enseignement supérieur	10,3	(9,0-11,7)	9,3	(8,0-10,7)	3428
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	12,8	(10,0-15,6)	9,1	(7,1-11,6)	1029
	Brabant Flamand	14,2	(10,8-17,6)	9,6	(7,3-12,6)	565
	Flandre Occidentale	16,4	(12,9-19,8)	11,2	(8,8-14,3)	669
	Flandre Orientale	14,4	(11,3-17,5)	10,1	(7,9-12,8)	656
	Limbourg	11,5	(7,8-15,1)	8,2	(5,9-11,4)	483
	Bruxelles	16,5	(14,9-18,2)	13,5	(11,9-15,2)	2807
	Brabant Wallon	18,4	(13,2-23,5)	13,1	(9,5-17,8)	305
	Hainaut	17,8	(15,3-20,3)	13,5	(11,4-16,0)	1305
	Liège	23,0	(18,9-27,1)	18,3	(14,9-22,4)	774
	Luxembourg	19,7	(14,0-25,5)	16,2	(11,2-23,0)	291
	Namur	17,3	(13,3-21,3)	13,1	(10,3-16,6)	507
Communauté Germanophone	15,3	(8,1-22,5)	9,0	(5,6-14,2)	210	
ANNEE D'ENQUETE	1997	10,2	(9,2-11,2)	8,7	(7,9-9,7)	8510
	2001	13,3	(12,3-14,3)	10,0	(9,2-10,9)	10115
	2004	15,2	(14,2-16,3)	11,6	(10,6-12,6)	11164
	2008	15,9	(14,9-16,9)	11,8	(10,9-12,8)	9601

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) Population de 15 ans et plus



Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) qui déclare avoir pris des médicaments psychotropes au cours des 2 dernières semaines, Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone

MH_14		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	4,5	(0,0-9,2)			88
	Femme	22,7	(12,6-32,8)			122
GROUPE D'AGE	15 - 24	0,0		0,0		24
	25 - 44	3,6	(0,0-10,8)	2,2	(0,3-14,4)	42
	45 - 64	9,2	(0,0-19,0)	5,8	(1,9-16,2)	57
	65 +	40,1	(22,7-57,5)	31,4	(15,8-52,6)	87
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	26,4	(9,1-43,7)			56
	Secondaire inférieur	15,4	(0,0-34,8)			52
	Secondaire supérieur	9,7	(0,0-21,6)			42
	Enseignement supérieur	12,7	(0,0-28,3)			39
ANNEE D'ENQUETE	1997	5,4	(2,4-8,5)	2,7	(1,3-5,6)	244
	2001	6,0	(2,3-9,6)	2,0	(0,9-4,1)	238
	2004	12,2	(7,4-16,9)	4,5	(2,4-8,5)	235
	2008	15,3	(8,1-22,5)	4,8	(2,6-8,7)	210

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) qui déclare avoir pris des somnifères au cours des 2 dernières semaines, Enquête de santé 2008 - Belgique

MH_11		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	6,0	(5,1-7,0)	3,9	(3,2-4,7)	4408
	Femme	13,4	(12,2-14,6)	8,3	(7,2-9,6)	5214
GROUPE D'AGE	15 - 24	1,6	(0,8-2,5)	1,5	(0,9-2,6)	1207
	25 - 44	3,2	(2,4-4,0)	3,0	(2,3-3,8)	2836
	45 - 64	10,2	(8,7-11,7)	9,7	(8,3-11,3)	2732
	65 +	25,8	(23,3-28,3)	23,9	(21,4-26,5)	2847
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	21,4	(18,3-24,4)	8,1	(6,4-10,4)	1455
	Secondaire inférieur	14,8	(12,1-17,4)	7,2	(5,7-9,1)	1551
	Secondaire supérieur	7,8	(6,5-9,0)	5,2	(4,3-6,4)	2873
	Enseignement supérieur	5,8	(4,7-6,9)	4,7	(3,8-5,7)	3432
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	7,1	(5,3-8,9)	4,0	(2,9-5,4)	1033
	Brabant Flamand	9,1	(6,5-11,7)	5,0	(3,5-7,0)	565
	Flandre Occidentale	11,0	(8,0-14,0)	5,9	(4,3-8,1)	669
	Flandre Orientale	9,9	(7,1-12,6)	5,5	(4,0-7,7)	658
	Limbourg	9,0	(5,7-12,3)	5,4	(3,7-7,9)	484
	Bruxelles	10,4	(9,1-11,8)	7,0	(5,8-8,4)	2813
	Brabant Wallon	8,6	(5,2-12,0)	4,6	(3,0-6,9)	308
	Hainaut	10,2	(8,3-12,1)	6,1	(4,8-7,6)	1310
	Liège	13,3	(10,2-16,5)	8,3	(6,3-11,0)	774
	Luxembourg	11,2	(6,8-15,7)	7,2	(4,5-11,5)	291
	Namur	10,4	(7,2-13,6)	6,2	(4,4-8,7)	507
	Communauté Germanophone	13,1	(6,2-20,0)	6,2	(3,6-10,5)	210
ANNEE D'ENQUETE	1997	5,5	(4,7-6,2)	4,0	(3,4-4,7)	8550
	2001	7,8	(7,1-8,6)	4,8	(4,2-5,4)	10126
	2004	9,4	(8,7-10,2)	5,9	(5,3-6,6)	11177
	2008	9,8	(9,0-10,7)	5,9	(5,3-6,6)	9622

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) qui déclare avoir pris des somnifères au cours des 2 dernières semaines, Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone

MH_11		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	4,2	(0,0-8,9)	0,0		88
	Femme	19,2	(9,6-28,8)	0,0		122
GROUPE D'AGE	15 - 24	0,0	,	0,0		24
	25 - 44	0,0	,	0,0		42
	45 - 64	7,1	(0,0-16,0)	4,6	(1,3-15,5)	57
	65 +	37,9	(20,5-55,4)	30,0	(14,9-51,2)	87
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	25,8	(8,6-42,9)	0,0		56
	Secondaire inférieur	15,4	(0,0-34,8)	0,0		52
	Secondaire supérieur	3,2	(0,0-10,0)	0,0		42
	Enseignement supérieur	10,6	(0,0-26,0)	0,0		39
ANNEE D'ENQUETE	1997	2,3	(0,7-3,9)	0,0		246
	2001	3,4	(0,4-6,4)	0,0		238
	2004	8,0	(4,0-12,0)	0,0	(0,0-0,1)	235
	2008	13,1	(6,2-20,0)	0,1	(0,0-0,1)	210

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) qui déclare avoir pris des tranquillisants au cours des 2 dernières semaines, Enquête de santé 2008 - Belgique

MH_12		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	4,8	(3,8-5,7)	4,0	(3,2-4,9)	4408
	Femme	10,1	(9,0-11,1)	8,2	(7,2-9,3)	5214
GROUPE D'AGE	15 - 24	1,6	(0,9-2,4)	1,5	(1,0-2,5)	1207
	25 - 44	4,7	(3,7-5,6)	4,4	(3,6-5,4)	2836
	45 - 64	10,2	(8,8-11,6)	9,7	(8,4-11,3)	2732
	65 +	12,1	(10,0-14,1)	10,9	(9,0-13,3)	2847
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	12,3	(10,0-14,6)	7,9	(6,2-10,1)	1455
	Secondaire inférieur	11,4	(8,6-14,2)	8,1	(6,1-10,7)	1551
	Secondaire supérieur	6,5	(5,4-7,6)	5,4	(4,5-6,5)	2873
	Enseignement supérieur	5,0	(4,1-5,8)	4,3	(3,5-5,2)	3432
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	5,6	(3,3-7,9)	4,2	(2,7-6,4)	1033
	Brabant Flamand	5,7	(3,6-7,8)	4,0	(2,7-5,8)	565
	Flandre Occidentale	4,9	(3,0-6,9)	3,5	(2,3-5,3)	669
	Flandre Orientale	4,1	(2,6-5,7)	3,0	(2,0-4,4)	658
	Limbourg	3,0	(1,1-5,0)	2,2	(1,2-4,3)	484
	Bruxelles	9,0	(7,8-10,3)	7,4	(6,3-8,7)	2813
	Brabant Wallon	11,8	(7,6-16,0)	8,6	(5,9-12,5)	308
	Hainaut	10,1	(8,2-12,0)	7,8	(6,3-9,6)	1310
	Liège	15,8	(12,4-19,1)	12,7	(10,1-15,9)	774
	Luxembourg	13,5	(8,4-18,6)	11,5	(7,5-17,2)	291
	Namur	10,0	(6,8-13,2)	7,8	(5,6-10,8)	507
	Communauté Germanophone	6,9	(2,1-11,8)	4,4	(2,2-8,8)	210
ANNEE D'ENQUETE	1997	4,5	(3,9-5,2)	3,9	(3,4-4,6)	8550
	2001	5,7	(5,1-6,4)	4,5	(3,9-5,0)	10126
	2004	6,6	(5,9-7,3)	5,1	(4,5-5,8)	11177
	2008	7,5	(6,8-8,3)	5,8	(5,2-6,5)	9622

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) qui déclare avoir pris des tranquillisants au cours des 2 dernières semaines, Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone

MH_12		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	1,9	(0,0-4,2)	0,0		88
	Femme	10,4	(2,5-18,3)	0,0		122
GROUPE D'AGE	15 - 24	0,0		0,0		24
	25 - 44	3,6	(0,0-10,8)	2,4	(0,3-15,3)	42
	45 - 64	7,4	(0,0-16,9)	5,1	(1,4-16,3)	57
	65 +	12,4	(1,6-23,3)	8,2	(3,1-20,1)	87
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	13,4	(0,0-27,1)	0,0		56
	Secondaire inférieur	0,4	(0,0-1,3)	0,0		52
	Secondaire supérieur	6,6	(0,0-16,3)	0,0		42
	Enseignement supérieur	9,0	(0,0-24,0)	0,0		39
ANNEE D'ENQUETE	1997	2,4	(0,8-4,0)	0,2	(0,1-0,3)	246
	2001	1,9	(0,0-4,0)	0,1	(0,0-0,3)	238
	2004	6,4	(2,7-10,1)	0,3	(0,2-0,6)	235
	2008	6,9	(2,1-11,8)	0,3	(0,1-0,6)	210

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) qui déclare avoir pris des antidépresseurs au cours des 2 dernières semaines, Enquête de santé 2008 - Belgique

MH_13		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	3,8	(2,9-4,7)	3,0	(2,3-3,9)	4396
	Femme	7,4	(6,4-8,3)	5,9	(5,1-6,9)	5204
GROUPE D'AGE	15 - 24	1,2	(0,5-1,9)	1,2	(0,7-2,0)	1205
	25 - 44	3,3	(2,6-4,1)	3,2	(2,5-4,0)	2832
	45 - 64	9,2	(7,7-10,6)	8,8	(7,5-10,4)	2722
	65 +	7,1	(5,2-9,0)	6,5	(4,8-8,7)	2841
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	8,3	(6,4-10,2)	5,9	(4,5-7,8)	1450
	Secondaire inférieur	8,6	(5,9-11,2)	6,1	(4,4-8,5)	1546
	Secondaire supérieur	5,6	(4,6-6,7)	4,6	(3,7-5,6)	2866
	Enseignement supérieur	3,6	(2,7-4,4)	2,9	(2,3-3,8)	3428
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	5,2	(2,9-7,5)	3,9	(2,4-6,3)	1029
	Brabant Flamand	5,0	(2,9-7,1)	3,6	(2,3-5,4)	565
	Flandre Occidentale	6,2	(4,1-8,4)	4,6	(3,2-6,6)	669
	Flandre Orientale	4,6	(2,9-6,3)	3,4	(2,3-4,9)	656
	Limbourg	3,2	(1,3-5,1)	2,3	(1,3-4,2)	483
	Bruxelles	7,0	(5,8-8,1)	5,7	(4,7-7,0)	2807
	Brabant Wallon	7,7	(4,0-11,4)	5,5	(3,3-9,1)	304
	Hainaut	5,9	(4,3-7,5)	4,5	(3,3-5,9)	1305
	Liège	7,3	(4,9-9,7)	5,6	(3,9-7,9)	774
	Luxembourg	6,9	(3,0-10,8)	5,8	(3,2-10,2)	291
	Namur	6,5	(4,0-8,9)	5,0	(3,3-7,4)	507
	Communauté Germanophone	2,7	(0,0-6,0)	1,7	(0,5-5,5)	210
ANNEE D'ENQUETE	1997	3,9	(3,2-4,5)	3,3	(2,8-3,9)	8510
	2001	4,9	(4,3-5,5)	3,9	(3,5-4,5)	10115
	2004	6,0	(5,4-6,7)	4,8	(4,2-5,5)	11164
	2008	5,7	(5,0-6,3)	4,5	(3,9-5,1)	9600

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) qui déclare avoir pris des antidépresseurs au cours des 2 dernières semaines, Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone

MH_13		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	0,2	(0,0-0,7)	0,0		88
	Femme	4,5	(0,0-9,9)	0,0		122
GROUPE D'AGE	15 - 24	0,0	,	0,0		24
	25 - 44	0,0	,	0,0		42
	45 - 64	5,1	(0,0-13,6)	2,1	(0,5-8,5)	57
	65 +	3,3	(0,0-6,7)	1,2	(0,2-5,6)	87
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	2,9	(0,0-6,5)	0,0		56
	Secondaire inférieur	0,4	(0,0-1,1)	0,0		52
	Secondaire supérieur	0,0	,	0,0		42
	Enseignement supérieur	9,5	(0,0-24,4)	0,0		39
ANNEE D'ENQUETE	1997	2,8	(0,2-5,4)	0,2	(0,1-0,7)	244
	2001	1,6	(0,1-3,1)	0,1	(0,0-0,3)	238
	2004	5,5	(2,4-8,5)	0,4	(0,2-0,7)	235
	2008	2,7	(0,0-6,0)	0,2	(0,1-0,5)	210

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Limitations fonctionnelles (IL)

Limitations dans la réalisation des activités de base (IL_6)

En Communauté Germanophone en 2008, 45% des personnes présentent une limitation moyenne à sérieuse dans la réalisation d'activités de base. Cet indicateur reprend des activités telles que: marcher, monter-descendre un escalier, se pencher en avant, porter un sac de courses, ... Ces activités doivent pouvoir être menées sans aide extérieure. S'y ajoutent également les limitations en rapport avec la vision et l'audition. Pour ces dernières, les limitations sont mesurées avec l'usage courant de lunettes ou d'appareils auditifs.

Il n'y a pas de différence significative à ce sujet entre les hommes et les femmes. Par contre, ce pourcentage augmente avec l'âge: 14% chez les 15-24 ans pour atteindre 89% chez les 65 ans et plus.

Ce taux ne varie pas de manière significative en fonction du niveau d'éducation.

Le pourcentage de personnes en Communauté Germanophone qui présentent une limitation dans les activités de base n'est pas significativement différent de celui observé dans les provinces belges.

L'évolution au cours du temps n'a pas pu être étudiée pour des raisons d'ordre méthodologique.

Limitations dans la réalisation des activités de la vie quotidienne (IL_8)

Cet indicateur permet de vérifier dans quelle mesure les personnes sont confrontées à des problèmes dans l'exécution des activités en relation avec les soins personnels: se mettre ou sortir du lit, s'habiller ou se déshabiller, prendre un bain ou une douche,

En Communauté Germanophone en 2008, 10% des personnes présentent une limitation moyenne à sérieuse dans la réalisation d'activités de la vie quotidienne.

Il n'y a pas de différence significative à ce sujet entre les hommes et les femmes. Par contre, ce pourcentage augmente avec l'âge pour atteindre 20% chez les 65 ans et plus.

Le pourcentage de personnes en Communauté Germanophone qui présentent une limitation dans les activités de la vie quotidienne n'est pas significativement différent de celui observé dans les provinces belges.



Limitations dans la réalisation des activités instrumentales de la vie quotidienne (IL_11)

On vérifie ici le nombre de personnes qui ont des problèmes avec l'exécution d'une série (sélectionnée) d'activités instrumentales de la vie quotidienne: préparer un repas, utiliser le téléphone, faire des courses, faire la lessive,

En Communauté Germanophone en 2008, 13% des personnes présentent une limitation moyenne à sérieuse dans la réalisation d'activités instrumentales de la vie quotidienne.

On observe une différence à ce sujet entre les hommes (6%) et les femmes (18%), mais celle-ci n'est pas statistiquement significative (en raison du petit nombre de sujets).

Ce pourcentage varie de manière significative avec l'âge pour atteindre 38% chez les 65 ans et plus.

Les différences observées en ce qui concerne le niveau d'éducation (avec un taux de 29% chez les personnes avec un diplôme d'école primaire) ne sont pas significatives en raison du petit nombre d'observations.

Le pourcentage de personnes en Communauté Germanophone qui présentent une limitation dans les activités de la vie quotidienne n'est pas significativement différent de celui observé dans les provinces belges à part pour les provinces d'Anvers et de Flandre Orientale, ainsi que la Région de Bruxelles où les taux sont plus élevés.



Pourcentage de la population avec des restrictions dans les activités de bases,
Enquête de santé 2008 - Belgique

IL_6		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	33,8	(31,9-35,7)	30,7	(28,6-32,9)	4404
	Femme	42,4	(40,5-44,3)	37,6	(35,4-39,9)	5219
GROUPE D'AGE	15 - 24	9,8	(7,5-12,0)	9,7	(7,7-12,2)	1199
	25 - 44	17,3	(15,5-19,2)	17,3	(15,4-19,2)	2832
	45 - 64	46,2	(43,6-48,9)	46,3	(43,6-48,9)	2736
	65 +	79,2	(76,6-81,8)	78,9	(76,2-81,4)	2856
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	65,8	(61,6-70,0)	46,6	(41,2-52,0)	1453
	Secondaire inférieur	56,1	(52,3-59,9)	46,5	(42,0-51,1)	1552
	Secondaire supérieur	34,6	(32,1-37,2)	33,3	(30,6-36,2)	2879
	Enseignement supérieur	25,4	(23,2-27,5)	26,4	(23,9-29,1)	3430
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	38,2	(34,2-42,1)	34,0	(29,9-38,3)	1032
	Brabant Flamand	39,7	(33,5-46,0)	33,6	(27,0-40,9)	561
	Flandre Occidentale	40,9	(35,8-46,0)	34,4	(29,4-39,8)	669
	Flandre Orientale	40,6	(35,7-45,6)	35,9	(30,4-41,8)	657
	Limbourg	34,0	(28,1-40,0)	29,7	(23,9-36,2)	482
	Bruxelles	36,3	(34,2-38,5)	36,3	(33,7-38,9)	2820
	Brabant Wallon	34,1	(26,3-41,8)	27,4	(20,5-35,5)	309
	Hainaut	36,5	(33,2-39,8)	32,7	(29,2-36,4)	1312
	Liège	41,4	(36,7-46,0)	38,7	(33,6-44,0)	770
	Luxembourg	30,7	(23,6-37,8)	26,6	(19,6-35,1)	291
	Namur	37,7	(31,6-43,8)	34,5	(27,5-42,3)	510
	Communauté Germanophone	45,0	(35,4-54,6)	34,8	(27,3-43,0)	210
ANNEE D'ENQUETE	2008	38,3	(36,8-39,8)	34,2	(32,4-35,9)	9623

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



**Pourcentage de la population avec des restrictions dans les activités de bases,
Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone**

IL_6		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	46,8	(33,4-60,2)	42,4	(25,3-61,6)	88
	Femme	43,7	(32,0-55,4)	35,7	(24,7-48,6)	122
GROUPE D'AGE	15 - 24	13,8	(0,0-31,8)	14,2	(3,8-40,8)	24
	25 - 44	15,5	(3,5-27,4)	15,5	(7,1-30,7)	42
	45 - 64	41,4	(29,0-53,8)	41,8	(30,3-54,2)	57
	65 +	88,8	(80,6-97,0)	89,2	(78,1-95,1)	87
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	64,0	(38,5-89,5)	28,2	(12,5-51,9)	56
	Secondaire inférieur	43,9	(21,8-66,0)	24,9	(11,6-45,5)	52
	Secondaire supérieur	31,1	(14,7-47,5)	46,2	(26,7-66,9)	42
	Enseignement supérieur	46,6	(25,1-68,0)	48,9	(24,8-73,5)	39
ANNEE D'ENQUETE	2008	45,0	(35,4-54,6)	39,0	(28,3-50,8)	210

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Pourcentage de la population avec des restrictions dans les activités de la vie quotidienne,
Enquête de santé 2008 - Belgique

IL_8		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	7,0	(6,0-8,0)	3,9	(3,2-4,8)	4398
	Femme	12,9	(11,7-14,1)	6,5	(5,4-7,7)	5214
GROUPE D'AGE	15 - 24	1,2	(0,4-2,0)	1,1	(0,6-2,3)	1199
	25 - 44	2,5	(1,7-3,3)	2,4	(1,7-3,3)	2829
	45 - 64	8,1	(6,7-9,4)	7,8	(6,5-9,3)	2732
	65 +	31,5	(28,9-34,1)	30,2	(27,7-32,9)	2852
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	26,8	(23,5-30,2)	9,0	(7,1-11,3)	1451
	Secondaire inférieur	15,4	(12,9-17,9)	7,0	(5,4-8,9)	1552
	Secondaire supérieur	7,5	(6,2-8,8)	4,8	(3,9-6,0)	2874
	Enseignement supérieur	4,5	(3,5-5,5)	3,6	(2,7-4,6)	3427
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	12,5	(10,0-15,0)	6,8	(5,1-9,0)	1032
	Brabant Flamand	11,4	(8,2-14,7)	5,5	(3,7-8,1)	561
	Flandre Occidentale	9,2	(6,8-11,7)	3,9	(2,8-5,5)	669
	Flandre Orientale	10,0	(7,4-12,7)	4,8	(3,5-6,6)	655
	Limbourg	7,1	(4,7-9,5)	3,6	(2,5-5,2)	482
	Bruxelles	9,2	(8,0-10,4)	5,1	(4,2-6,2)	2813
	Brabant Wallon	9,7	(6,0-13,5)	4,6	(3,0-7,0)	309
	Hainaut	9,1	(7,4-10,8)	4,6	(3,5-5,9)	1309
	Liège	9,6	(7,3-12,0)	4,8	(3,5-6,5)	770
	Luxembourg	7,5	(4,3-10,8)	3,6	(2,1-6,3)	292
	Namur	12,2	(8,5-15,9)	6,6	(4,5-9,7)	510
	Communauté Germanophone	9,7	(4,6-14,8)	3,7	(2,0-6,7)	210
ANNEE D'ENQUETE	2008	10,1	(9,3-10,9)	5,1	(4,3-5,9)	9612

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Pourcentage de la population avec des restrictions dans les activités de la vie quotidienne,
Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone

IL_8		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	8,4	(1,6-15,1)	0,7	(0,3-1,8)	88
	Femme	10,6	(3,2-18,0)	0,8	(0,3-1,9)	122
GROUPE D'AGE	15 - 24	0,0	,	0,0	(0,0-0,0)	24
	25 - 44	4,1	(0,0-10,2)	4,1	(1,0-15,2)	42
	45 - 64	8,7	(0,6-16,8)	8,5	(3,3-20,2)	57
	65 +	20,3	(9,6-31,0)	19,8	(11,7-31,5)	87
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	12,9	(1,1-24,7)			56
	Secondaire inférieur	9,0	(0,2-17,9)			52
	Secondaire supérieur	8,4	(0,2-16,6)			42
	Enseignement supérieur	8,6	(0,0-25,7)			39
ANNEE D'ENQUETE	2008	9,7	(4,6-14,8)	0,8	(0,4-1,4)	210

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Pourcentage de la population avec des restrictions dans les activités instrumentales de la vie quotidienne, Enquête de santé 2008 - Belgique

IL_11		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	9,8	(8,5-11,0)	6,6	(5,6-7,8)	4390
	Femme	19,7	(18,2-21,2)	13,1	(11,4-14,9)	5199
GROUPE D'AGE	15 - 24	3,7	(1,6-5,9)	3,5	(2,0-6,2)	1194
	25 - 44	4,8	(3,7-5,8)	4,5	(3,6-5,6)	2828
	45 - 64	12,5	(10,8-14,2)	12,0	(10,4-13,8)	2726
	65 +	42,8	(39,9-45,7)	41,0	(38,0-44,0)	2841
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	38,1	(34,2-42,0)	17,9	(14,9-21,3)	1448
	Secondaire inférieur	23,0	(19,8-26,2)	13,4	(10,6-16,7)	1548
	Secondaire supérieur	11,3	(9,7-12,8)	8,4	(7,2-9,9)	2869
	Enseignement supérieur	7,0	(5,7-8,3)	6,3	(5,0-7,7)	3417
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	17,1	(14,0-20,2)	11,4	(9,0-14,3)	1030
	Brabant Flamand	15,0	(11,4-18,5)	8,7	(6,1-12,3)	560
	Flandre Occidentale	15,4	(12,0-18,8)	8,7	(6,6-11,3)	666
	Flandre Orientale	17,9	(14,2-21,6)	11,7	(8,6-15,7)	653
	Limbourg	12,3	(8,8-15,8)	7,9	(5,6-11,1)	482
	Bruxelles	15,1	(13,6-16,6)	10,8	(9,4-12,4)	2803
	Brabant Wallon	11,9	(7,6-16,1)	6,5	(4,4-9,5)	308
	Hainaut	12,7	(10,8-14,6)	7,7	(6,3-9,3)	1308
	Liège	13,9	(11,0-16,8)	8,5	(6,6-11,0)	769
	Luxembourg	11,7	(7,2-16,1)	7,0	(4,1-11,6)	292
	Namur	12,0	(8,3-15,7)	7,1	(4,9-10,2)	508
	Communauté Germanophone	13,1	(7,8-18,4)	5,9	(4,1-8,6)	210
ANNEE D'ENQUETE	2008	14,9	(13,9-15,9)	9,4	(8,3-10,6)	9589

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Pourcentage de la population avec des restrictions dans les activités instrumentales de la vie quotidienne, Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone

IL_11		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	6,2	(0,8-11,6)			88
	Femme	17,8	(10,1-25,6)			122
GROUPE D'AGE	15 - 24	0,0	,	0,0		24
	25 - 44	6,7	(0,0-14,7)	5,3	(1,4-18,4)	42
	45 - 64	2,8	(0,0-7,1)	2,1	(0,4-10,8)	57
	65 +	38,3	(25,0-51,7)	33,4	(22,7-46,1)	87
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	29,3	(10,9-47,6)			56
	Secondaire inférieur	9,4	(0,5-18,3)			52
	Secondaire supérieur	7,8	(0,0-16,0)			42
	Enseignement supérieur	6,4	(0,0-14,6)			39
ANNEE D'ENQUETE	2008	13,1	(7,8-18,4)			210

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Douleurs physiques (PI)

Score moyen de douleur physique mesuré par le SF-36

En Communauté Germanophone en 2008, le score moyen de douleur est de 23,5 (sur une échelle allant de 0 à 100) au sein de la population âgée de 15 ans et plus.

Il n'y a pas de différence significative à ce sujet entre les hommes et les femmes. On observe par contre une augmentation de ce score avec l'âge de 21 chez les 15-24 ans à 34 chez les 65 ans ou plus.

Le score de douleur physique ne varie pas de manière significative en fonction du niveau d'éducation.

Le score de douleur physique en Communauté Germanophone chez les 15 ans et plus:

- n'est pas différent de celui observé dans les provinces belges
- n'a pas augmenté de manière significative entre 1997 (18) et 2008 (23,5).



Score moyen de douleur physique mesuré par le SF-36 au sein de la population âgée de 15 ans et plus, Enquête de santé 2008 - Belgique

PL_1		Moyenne brut	+ IC 95 %	Moyenne stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	20,0	(18,8-21,3)	19,8	(18,6-21,0)	3754
	Femme	28,1	(26,9-29,4)	27,5	(26,3-28,7)	4546
GROUPE D'AGE	15 - 24	15,5	(13,4-17,6)	15,4	(13,4-17,5)	894
	25 - 44	20,2	(18,9-21,6)	20,1	(18,8-21,5)	2511
	45 - 64	25,7	(24,2-27,2)	25,8	(24,2-27,3)	2504
	65 +	33,7	(31,4-35,9)	33,2	(30,9-35,4)	2391
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	33,9	(31,1-36,7)	29,7	(26,7-32,6)	1199
	Secondaire inférieur	28,5	(25,7-31,4)	26,4	(23,7-29,2)	1367
	Secondaire supérieur	24,1	(22,5-25,6)	24,0	(22,5-25,5)	2532
	Enseignement supérieur	19,9	(18,6-21,2)	20,6	(19,3-21,9)	3003
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	25,9	(23,1-28,7)	25,3	(22,6-28,0)	933
	Brabant Flamand	23,7	(20,8-26,6)	22,9	(20,0-25,9)	521
	Flandre Occidentale	22,8	(20,0-25,6)	22,1	(19,5-24,7)	625
	Flandre Orientale	26,4	(23,5-29,4)	25,6	(22,8-28,4)	593
	Limbourg	17,6	(14,6-20,7)	17,4	(14,4-20,4)	435
	Bruxelles	24,3	(22,9-25,7)	24,6	(23,2-26,0)	2253
	Brabant Wallon	23,3	(18,9-27,7)	22,1	(17,8-26,4)	265
	Hainaut	26,1	(23,9-28,3)	25,4	(23,3-27,5)	1117
	Liège	24,8	(22,1-27,6)	24,1	(21,5-26,8)	694
	Luxembourg	20,7	(16,3-25,2)	21,0	(16,7-25,2)	257
	Namur	24,7	(20,9-28,4)	23,7	(20,1-27,3)	416
	Communauté Germanophone	23,5	(18,7-28,3)	21,4	(16,9-25,8)	191
	ANNEE D'ENQUETE	1997	23,0	(22,1-23,8)	24,1	(23,3-25,0)
2008		24,3	(23,4-25,2)	23,8	(22,9-24,7)	8300

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Score moyen de douleur physique mesuré par le SF-36 au sein de la population âgée de 15 ans et plus, Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone

PL_1		Moyenne brut	+ IC 95 %	Moyenne stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	22,6	(15,9-29,3)	20,7	(13,8-27,7)	81
	Femme	24,1	(18,1-30,1)	22,0	(16,3-27,6)	110
GROUPE D'AGE	15 - 24	20,8	(10,6-31,0)	20,6	(11,3-29,8)	23
	25 - 44	15,2	(6,4-24,0)	15,1	(6,5-23,7)	39
	45 - 64	21,5	(13,5-29,5)	21,4	(13,7-29,1)	56
	65 +	34,2	(26,2-42,3)	34,1	(26,2-42,0)	73
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	29,9	(19,0-40,9)	22,7	(12,2-33,2)	50
	Secondaire inférieur	18,9	(8,4-29,3)	14,7	(5,7-23,7)	50
	Secondaire supérieur	20,1	(8,7-31,6)	21,6	(10,4-32,8)	36
	Enseignement supérieur	24,6	(14,2-35,0)	25,1	(15,0-35,1)	37
ANNEE D'ENQUETE	1997	17,9	(14,6-21,2)	20,4	(17,1-23,6)	242
	2008	23,5	(18,7-28,3)	21,2	(16,6-25,9)	191

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Statut pondéral (NS)

Surpoids

En Communauté Germanophone en 2008, 52% des personnes âgées de 18 ans et plus présentent un surpoids (Body Mass Index ou Indice de Masse Corporelle ≥ 25).

Le pourcentage de personnes avec un surpoids est plus élevé chez les hommes (64%) que chez les femmes (44%). On n'observe pas, par contre, de différence à ce sujet en fonction de l'âge ou du niveau d'éducation.

Le pourcentage de personnes âgées de 18 ans et plus qui présentent un surpoids en Communauté Germanophone:

- n'est pas différent des taux observés dans les provinces belges;
- semble avoir augmenté de 1997 (41%) à 2008 (52%), mais cette différence n'est pas significative.

Obésité

En Communauté Germanophone en 2008, 14,5% des personnes âgées de 18 ans et plus sont obèses (Body Mass Index ou Indice de Masse Corporelle ≥ 30).

On n'observe pas de différence à ce sujet entre les hommes et les femmes. Ce taux augmente par contre avec l'âge de 1,5% chez les 18-24 ans à 20% chez les 65 ans et plus.

Le pourcentage de personnes obèses est plus élevé parmi celles qui ont au maximum un niveau d'éducation primaire (28%) par rapport à celles qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur (4,5%).

Le pourcentage de personnes âgées de 18 ans et plus en Communauté Germanophone qui sont obèses:

- n'est pas différent des taux observés dans les provinces belges;
- a augmenté de manière significative entre 1997 (9%) et 2008 (14,5%).



Pourcentage de la population adulte (de 18 ans et plus) ayant un surpoids (BMI \geq 25),
Enquête de santé 2008 – Belgique

NS_3		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	53,7	(51,7-55,8)	51,8	(49,5-54,0)	4093
	Femme	40,4	(38,4-42,4)	37,2	(35,1-39,4)	4737
GROUPE D'AGE	18 - 24	18,5	(14,7-22,3)	18,0	(14,5-22,0)	837
	25 - 44	41,2	(38,7-43,8)	40,9	(38,3-43,6)	2759
	45 - 64	55,4	(52,9-57,9)	55,3	(52,8-57,8)	2650
	65 +	56,3	(53,3-59,4)	57,4	(54,2-60,5)	2584
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	57,9	(53,9-61,8)	52,9	(48,1-57,7)	1291
	Secondaire inférieur	54,7	(50,8-58,6)	49,5	(45,3-53,8)	1441
	Secondaire supérieur	47,8	(45,1-50,6)	46,4	(43,5-49,2)	2655
	Enseignement supérieur	40,0	(37,7-42,4)	38,1	(35,6-40,6)	3197
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	48,8	(44,7-52,9)	46,0	(41,6-50,5)	948
	Brabant Flamand	49,0	(43,3-54,7)	46,1	(40,1-52,3)	525
	Flandre Occidentale	45,6	(40,9-50,4)	41,8	(37,0-46,7)	613
	Flandre Orientale	43,1	(38,0-48,1)	39,8	(35,2-44,7)	617
	Limbourg	50,2	(44,3-56,1)	46,9	(40,4-53,6)	453
	Bruxelles	39,8	(37,5-42,0)	38,9	(36,5-41,4)	2582
	Brabant Wallon	43,2	(35,4-51,1)	40,5	(33,6-47,7)	284
	Hainaut	51,2	(47,8-54,6)	49,1	(45,4-52,8)	1196
	Liège	46,5	(41,8-51,1)	44,1	(39,4-48,9)	708
	Luxembourg	49,3	(41,2-57,4)	47,8	(39,5-56,1)	259
	Namur	50,3	(43,7-56,9)	48,0	(41,3-54,7)	450
	Communauté Germanophone	52,0	(43,0-60,9)	47,6	(37,4-58,1)	195
ANNEE D'ENQUETE	1997	41,3	(39,7-42,9)	40,4	(38,7-42,2)	8071
	2001	44,5	(43,1-45,9)	42,0	(40,5-43,5)	9391
	2004	44,1	(42,7-45,5)	41,5	(40,0-43,0)	10319
	2008	46,9	(45,4-48,4)	44,1	(42,5-45,7)	8830

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 18 ans et plus



**Pourcentage de la population adulte (de 18 ans et plus) ayant un surpoids (BMI \geq 25),
Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone**

NS_3		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	63,6	(49,8-77,5)	60,2	(43,2-75,1)	81
	Femme	43,9	(32,6-55,2)	41,0	(28,9-54,2)	114
GROUPE D'AGE	18 – 24	42,0	(13,2-70,7)	44,9	(21,7-70,5)	16
	25 – 44	45,3	(27,6-62,9)	46,1	(30,2-62,7)	40
	45 – 64	56,4	(40,5-72,3)	57,7	(41,2-72,6)	56
	65 +	54,5	(39,4-69,7)	57,2	(41,7-71,5)	83
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	54,2	(38,7-69,8)	50,5	(28,3-72,5)	55
	Secondaire inférieur	47,7	(27,2-68,2)	42,8	(24,2-63,7)	51
	Secondaire supérieur	48,3	(27,7-68,8)	50,5	(29,4-71,5)	35
	Enseignement supérieur	58,2	(36,0-80,5)	56,1	(33,6-76,3)	37
ANNEE D'ENQUETE	1997	41,0	(33,6-48,4)	40,7	(33,3-48,6)	233
	2001	49,8	(40,4-59,2)	47,9	(38,6-57,4)	216
	2004	52,0	(43,2-60,9)	48,0	(38,8-57,3)	213
	2008	52,0	(43,0-60,9)	46,9	(36,0-58,1)	195

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 18 ans et plus



**Pourcentage de la population adulte (de 18 ans et plus) avec obésité (BMI \geq 30),
Enquête de santé 2008 – Belgique**

NS_4		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	13,1	(11,8-14,5)	11,6	(10,2-13,0)	4093
	Femme	14,4	(13,0-15,8)	12,7	(11,2-14,3)	4737
GROUPE D'AGE	18 - 24	4,8	(2,4-7,2)	4,8	(2,9-7,8)	837
	25 - 44	11,4	(9,8-13,0)	11,4	(9,9-13,1)	2759
	45 - 64	17,8	(15,9-19,7)	17,8	(16,0-19,8)	2650
	65 +	15,6	(13,5-17,7)	15,5	(13,5-17,7)	2584
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	19,2	(16,0-22,3)	16,8	(13,8-20,3)	1291
	Secondaire inférieur	19,9	(16,9-22,9)	17,1	(14,3-20,2)	1441
	Secondaire supérieur	14,5	(12,6-16,3)	13,1	(11,4-15,1)	2655
	Enseignement supérieur	9,1	(7,7-10,6)	8,1	(6,6-9,7)	3197
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	13,1	(10,5-15,6)	11,5	(9,4-14,0)	948
	Brabant Flamand	16,9	(12,6-21,2)	14,7	(11,2-19,0)	525
	Flandre Occidentale	11,2	(8,4-14,1)	9,6	(7,4-12,4)	613
	Flandre Orientale	11,5	(8,4-14,7)	10,0	(7,5-13,1)	617
	Limbourg	18,2	(12,7-23,7)	15,9	(11,1-22,3)	453
	Bruxelles	11,9	(10,4-13,4)	11,1	(9,6-12,8)	2582
	Brabant Wallon	10,2	(5,9-14,4)	8,6	(5,6-12,9)	284
	Hainaut	16,7	(14,0-19,3)	14,8	(12,3-17,5)	1196
	Liège	11,6	(8,8-14,3)	10,2	(7,9-13,0)	708
	Luxembourg	14,1	(9,2-19,1)	12,9	(9,0-18,3)	259
	Namur	18,5	(14,1-22,9)	16,6	(12,8-21,1)	450
	Communauté Germanophone	14,5	(7,9-21,0)	11,6	(7,1-18,4)	195
ANNEE D'ENQUETE	1997	10,8	(9,8-11,9)	9,8	(8,8-10,8)	8071
	2001	12,1	(11,2-13,0)	10,4	(9,5-11,2)	9391
	2004	12,7	(11,7-13,6)	10,8	(9,9-11,7)	10319
	2008	13,8	(12,7-14,8)	11,6	(10,7-12,7)	8830

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence)

Population de 18 ans et plus



**Pourcentage de la population adulte (de 18 ans et plus) avec obésité (BMI \geq 30),
Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone**

NS_4		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	12,5	(1,6-23,5)	0,9	(0,3-2,4)	81
	Femme	15,8	(7,4-24,2)	1,4	(0,8-2,4)	114
GROUPE D'AGE	18 – 24	1,5	(0,0-5,2)	1,5	(0,2-11,7)	16
	25 – 44	16,4	(0,0-33,6)	16,2	(5,1-41,1)	40
	45 – 64	11,9	(3,1-20,7)	11,7	(5,6-22,9)	56
	65 +	20,3	(7,1-33,6)	19,7	(10,4-34,2)	83
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	27,8	(13,0-42,6)	3,2	(1,2-8,2)	55
	Secondaire inférieur	13,5	(0,0-27,1)	1,0	(0,3-3,0)	51
	Secondaire supérieur	10,8	(0,0-29,7)	0,5	(0,1-2,7)	35
	Enseignement supérieur	4,5	(0,0-11,0)	0,2	(0,0-0,9)	37
ANNEE D'ENQUETE	1997	8,6	(4,8-12,3)	7,4	(4,5-12,1)	233
	2001	11,7	(6,6-16,9)	9,4	(5,5-15,6)	216
	2004	16,0	(10,1-21,9)	12,3	(8,0-18,3)	213
	2008	14,5	(7,9-21,0)	10,6	(6,4-17,1)	195

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence)
Population de 18 ans et plus



2. Style de Vie et Prévention

Activité physique (PA)

Activités physiques globales

En Communauté Germanophone en 2008, 53% des personnes âgées de 15 ans et plus ont pratiqué des activités physiques au moins 30 minutes par jour.

Il n'y a pas de différence significative à ce sujet entre les hommes et les femmes, ni en fonction de l'âge ou du niveau d'éducation.

Le pourcentage de personnes âgées de 15 ans et plus en Communauté Germanophone qui ont pratiqué des activités physiques au moins 30 minutes par jour:

- est significativement plus élevé que dans les différentes provinces de la Région wallonne et qu'en Région bruxelloise.
- a baissé de manière significative en 2004 tandis que les taux sont équivalents en 2001 et 2008 (53%).

Activités physiques de loisir

En Communauté Germanophone en 2008, 22% des personnes âgées de 15 ans et plus sont à risque par manque d'activités physiques de loisir.

Il n'y a pas de différence significative à ce sujet entre les hommes et les femmes, ni en fonction de l'âge ou du niveau d'éducation.

Le pourcentage de personnes âgées de 15 ans et plus en Communauté Germanophone qui sont à risque par manque d'activités physiques de loisir:

- est significativement plus bas que dans les provinces du Hainaut et de Liège et qu'en Région bruxelloise;
- n'a pas varié de manière significative au cours des dix dernières années (de 19% en 1997 à 22% en 2008).



Pourcentage de la population qui a consacré au moins 30 minutes par jour à des activités physiques (modérées ou intenses), Enquête de santé 2008 - Belgique

PA_03T		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	48,7	(46,2-51,2)	48,0	(45,5-50,5)	2810
	Femme	28,3	(25,9-30,7)	27,6	(25,2-30,1)	3316
GROUPE D'AGE	15 - 24	54,3	(49,1-59,5)	54,5	(49,2-59,8)	715
	25 - 44	41,6	(38,6-44,5)	41,7	(38,6-44,8)	1971
	45 - 64	37,1	(34,0-40,1)	36,1	(33,0-39,4)	1846
	65 +	22,3	(18,7-26,0)	22,2	(18,6-26,2)	1594
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	24,0	(18,8-29,2)	28,8	(22,8-35,7)	755
	Secondaire inférieur	32,4	(27,3-37,4)	34,2	(29,0-39,9)	918
	Secondaire supérieur	39,0	(35,9-42,2)	37,1	(33,9-40,4)	1852
	Enseignement supérieur	42,8	(39,8-45,7)	40,1	(36,9-43,3)	2454
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	48,9	(43,8-53,9)	48,1	(42,9-53,4)	671
	Brabant Flamand	40,1	(33,7-46,5)	40,6	(33,7-47,9)	418
	Flandre Occidentale	40,5	(34,2-46,9)	40,7	(34,3-47,3)	438
	Flandre Orientale	45,3	(39,5-51,1)	44,6	(38,4-50,9)	450
	Limbourg	49,3	(41,5-57,1)	47,9	(39,6-56,3)	320
	Bruxelles	24,7	(22,2-27,2)	22,1	(19,7-24,7)	1694
	Brabant Wallon	32,9	(24,7-41,1)	33,1	(25,3-42,0)	196
	Hainaut	25,5	(21,8-29,1)	23,7	(20,2-27,7)	793
	Liège	28,2	(23,2-33,3)	26,7	(21,9-32,2)	559
	Luxembourg	30,2	(20,7-39,6)	27,2	(19,6-36,3)	189
	Namur	32,1	(24,9-39,3)	30,6	(23,9-38,3)	279
	Communauté Germanophone	53,0	(39,8-66,3)	58,1	(43,8-71,1)	119
ANNEE D'ENQUETE	2001	39,0	(37,5-40,6)	38,4	(36,8-40,1)	8765
	2004	35,7	(34,0-37,3)	34,5	(32,8-36,2)	7116
	2008	38,1	(36,2-39,9)	37,4	(35,5-39,4)	6126

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Pourcentage de la population qui a consacré au moins 30 minutes par jour à des activités physiques (modérées ou intenses), Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone

PA_03T		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	63,5	(45,5-81,4)	59,2	(39,8-76,1)	46
	Femme	47,9	(31,4-64,4)	46,0	(29,1-63,8)	73
GROUPE D'AGE	15 - 24	61,6	(21,5-100,0)	64,0	(28,4-88,8)	17
	25 - 44	46,2	(21,9-70,4)	49,0	(27,2-71,1)	27
	45 - 64	63,2	(41,2-85,2)	65,2	(43,5-82,0)	31
	65 +	38,3	(20,0-56,7)	41,0	(25,3-58,7)	44
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	63,1	(34,0-92,2)	86,0	(53,1-97,1)	29
	Secondaire inférieur	54,0	(32,4-75,6)	55,2	(28,8-78,9)	25
	Secondaire supérieur	21,9	(0,0-44,7)	18,4	(5,7-45,7)	25
	Enseignement supérieur	67,2	(40,4-94,1)	64,1	(35,6-85,2)	27
ANNEE D'ENQUETE	2001	53,1	(44,4-61,7)	54,4	(45,6-62,9)	215
	2004	30,8	(21,3-40,3)	29,2	(20,4-39,9)	129
	2008	53,0	(39,8-66,3)	58,3	(44,3-71,1)	119

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Pourcentage de la population à risque par manque d'activité physique de loisir,
Enquête de santé 2008 - Belgique

PA01_3		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	22,5	(20,6-24,4)	22,1	(20,1-24,1)	3240
	Femme	30,1	(28,1-32,1)	28,8	(26,8-30,8)	3762
GROUPE D'AGE	15 - 24	17,0	(13,5-20,4)	16,9	(13,7-20,6)	852
	25 - 44	21,7	(19,3-24,1)	21,5	(19,2-24,0)	2194
	45 - 64	24,8	(22,4-27,2)	24,7	(22,3-27,2)	2163
	65 +	44,8	(41,2-48,3)	44,2	(40,7-47,8)	1793
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	49,3	(44,5-54,2)	41,4	(36,2-46,8)	829
	Secondaire inférieur	34,4	(30,5-38,3)	31,1	(27,4-35,1)	1082
	Secondaire supérieur	27,9	(25,2-30,6)	27,9	(25,2-30,8)	2166
	Enseignement supérieur	17,1	(15,1-19,2)	17,7	(15,7-20,0)	2762
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	19,9	(16,7-23,1)	18,6	(15,6-22,0)	844
	Brabant Flamand	24,7	(18,9-30,4)	23,2	(17,8-29,6)	466
	Flandre Occidentale	25,1	(20,0-30,2)	23,1	(18,5-28,6)	543
	Flandre Orientale	21,6	(17,4-25,8)	20,1	(16,3-24,6)	552
	Limbourg	20,7	(15,4-26,0)	19,9	(15,1-25,6)	383
	Bruxelles	31,3	(28,8-33,9)	31,4	(28,7-34,2)	1798
	Brabant Wallon	23,8	(17,0-30,6)	22,4	(16,6-29,5)	223
	Hainaut	41,5	(37,6-45,5)	41,4	(37,4-45,6)	865
	Liège	34,1	(29,4-38,7)	32,9	(28,4-37,8)	620
	Luxembourg	21,9	(15,7-28,2)	21,1	(15,5-28,0)	208
	Namur	28,0	(21,6-34,4)	26,6	(20,8-33,3)	333
	Communauté Germanophone	22,4	(13,3-31,5)	19,4	(12,3-29,2)	167
ANNEE D'ENQUETE	1997	32,9	(31,2-34,5)	34,1	(32,4-35,9)	7809
	2001	33,9	(32,4-35,3)	33,0	(31,5-34,4)	9455
	2004	24,8	(23,4-26,1)	24,2	(22,9-25,6)	8434
	2008	26,5	(25,0-27,9)	25,3	(23,8-26,8)	7002

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



**Pourcentage de la population à risque par manque d'activité physique de loisir,
Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone**

PA01_3		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	25,5	(12,1-38,9)	24,2	(12,4-41,8)	66
	Femme	20,6	(10,0-31,3)	18,5	(9,4-33,1)	101
GROUPE D'AGE	15 - 24	8,0	(0,0-23,6)	8,4	(1,4-37,8)	21
	25 - 44	16,4	(2,4-30,4)	16,8	(7,0-35,4)	33
	45 - 64	20,7	(6,6-34,8)	20,9	(10,4-37,7)	51
	65 +	37,4	(17,7-57,2)	38,0	(21,1-58,3)	62
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	19,3	(4,7-33,8)	9,6	(2,7-29,0)	43
	Secondaire inférieur	24,9	(3,2-46,6)	20,9	(9,0-41,4)	42
	Secondaire supérieur	34,6	(11,3-57,9)	40,6	(17,3-69,1)	32
	Enseignement supérieur	18,8	(3,3-34,3)	20,0	(7,8-42,4)	36
ANNEE D'ENQUETE	1997	18,7	(12,3-25,0)	20,5	(14,4-28,4)	234
	2001	17,5	(11,3-23,7)	16,2	(11,7-22,1)	226
	2004	18,6	(11,9-25,3)	19,0	(12,5-27,6)	169
	2008	22,4	(13,3-31,5)	20,5	(12,9-30,8)	167

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Habitudes nutritionnelles (NH)

Consommation de fruits

En Communauté Germanophone en 2008, 58% de la population déclare consommer des fruits chaque jour.

Il n'y a pas de différence significative à ce sujet entre les hommes et les femmes, ni en fonction de l'âge. Ce taux varie par contre de 40% chez les personnes qui ont seulement un niveau d'éducation primaire par rapport à 68% chez les personnes qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur.

Le pourcentage de personnes en Communauté Germanophone qui déclarent consommer des fruits chaque jour:

- n'est pas différent que dans les provinces belges, sauf pour ce qui est d'Anvers et de Flandre Orientale où les taux sont plus élevés (respectivement 68 et 66%);
- a augmenté entre 2001-4 (50 et 47%) et 2008 (56%).

Consommation de légumes

En Communauté Germanophone en 2008, 89% de la population déclare consommer des légumes chaque jour.

Il n'y a pas de différence significative à ce sujet entre les hommes et les femmes. Ce taux varie par contre avec l'âge: de 80% chez les 15-24 ans à 97% chez les 45-64 ans.

On n'observe pas de gradient socio-économique en ce qui concerne la consommation de légumes (seules les personnes avec un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ont un taux brut plus faible mais qui ne se confirme pas après standardisation).

Le pourcentage de personnes en Communauté Germanophone qui déclarent consommer des légumes chaque jour:

- n'est pas différent de celui observé dans les provinces belges, sauf pour ce qui est de Bruxelles où le taux est plus faible (75%);
- a augmenté entre 2004 (78%) et 2008 (89%).



Pourcentage de la population qui mange des fruits (excepté les jus de fruits) chaque jour, Enquête de santé 2008 - Belgique

NH01_1		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	59,8	(57,9-61,8)	60,0	(58,0-62,0)	5197
	Femme	68,4	(66,6-70,3)	68,4	(66,4-70,2)	5982
GROUPE D'AGE	0 - 24	61,4	(58,5-64,3)	61,6	(58,7-64,5)	2786
	25 - 44	58,9	(56,1-61,6)	59,0	(56,2-61,7)	2825
	45 - 64	67,0	(64,6-69,4)	67,2	(64,8-69,6)	2728
	65 +	73,6	(70,7-76,5)	73,2	(70,2-76,0)	2840
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	64,1	(60,3-68,0)	58,3	(53,7-62,8)	1526
	Secondaire inférieur	61,9	(57,7-66,1)	59,4	(54,9-63,8)	1719
	Secondaire supérieur	59,8	(57,0-62,7)	60,9	(57,9-63,7)	3395
	Enseignement supérieur	69,0	(66,7-71,3)	70,8	(68,4-73,1)	4193
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	67,8	(63,9-71,8)	68,3	(64,1-72,2)	1185
	Brabant Flamand	59,2	(53,0-65,4)	58,6	(52,2-64,6)	635
	Flandre Occidentale	66,2	(61,2-71,2)	66,0	(60,7-70,9)	752
	Flandre Orientale	69,4	(64,2-74,6)	69,5	(63,9-74,5)	764
	Limbourg	66,6	(60,4-72,8)	67,0	(60,4-73,0)	544
	Bruxelles	64,3	(62,0-66,7)	65,1	(62,7-67,5)	3307
	Brabant Wallon	62,5	(54,0-70,9)	61,5	(52,5-69,8)	377
	Hainaut	58,8	(55,5-62,1)	58,9	(55,6-62,1)	1537
	Liège	63,4	(58,8-68,0)	63,7	(58,8-68,3)	886
	Luxembourg	52,3	(44,3-60,4)	52,2	(44,2-60,2)	358
	Namur	61,7	(55,2-68,2)	62,0	(55,2-68,3)	594
	Communauté Germanophone	57,7	(48,2-67,2)	55,7	(45,7-65,2)	240
ANNEE D'ENQUETE	2001	51,4	(49,8-52,9)	51,5	(49,9-53,0)	11966
	2004	50,5	(48,9-52,0)	50,3	(48,8-51,9)	12838
	2008	64,3	(62,7-65,8)	64,4	(62,8-66,0)	11179

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population totale



**Pourcentage de la population qui mange des fruits (excepté les jus de fruits) chaque jour,
Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone**

NH01_1		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	52,0	(39,8-64,2)	47,9	(34,9-61,2)	106
	Femme	62,0	(49,8-74,3)	62,2	(48,7-74,1)	134
GROUPE D'AGE	0 - 24	61,1	(43,5-78,7)	60,9	(43,2-76,1)	55
	25 - 44	55,2	(39,8-70,6)	54,8	(40,3-68,6)	42
	45 - 64	56,5	(40,4-72,7)	56,0	(40,0-70,8)	57
	65 +	56,9	(40,3-73,6)	55,7	(39,0-71,3)	86
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	39,5	(24,2-54,8)	39,9	(22,8-59,9)	56
	Secondaire inférieur	66,7	(43,5-89,8)	63,6	(38,1-83,2)	57
	Secondaire supérieur	58,6	(42,7-74,5)	56,1	(37,2-73,3)	53
	Enseignement supérieur	67,5	(45,7-89,3)	66,0	(40,5-84,7)	48
ANNEE D'ENQUETE	2001	50,1	(41,2-58,9)	50,0	(41,3-58,7)	289
	2004	48,9	(39,2-58,6)	47,4	(38,3-56,7)	270
	2008	57,7	(48,2-67,2)	56,0	(45,9-65,7)	240

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population totale



Pourcentage de la population qui mange des légumes (excepté les pommes de terre et les jus de légumes) chaque jour, Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone

NH03_1		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	83,0	(81,6-84,5)	83,4	(81,9-84,8)	5197
	Femme	86,4	(85,0-87,8)	86,5	(85,1-87,8)	5993
GROUPE D'AGE	0 - 24	81,6	(79,4-83,7)	81,7	(79,4-83,8)	2786
	25 - 44	82,4	(80,3-84,5)	82,5	(80,3-84,5)	2829
	45 - 64	87,9	(86,2-89,6)	88,0	(86,2-89,6)	2731
	65 +	89,3	(87,5-91,2)	89,2	(87,2-90,9)	2844
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	82,7	(79,5-85,8)	79,2	(75,0-82,9)	1532
	Secondaire inférieur	82,9	(79,7-86,1)	81,5	(77,9-84,7)	1720
	Secondaire supérieur	83,6	(81,6-85,6)	84,6	(82,5-86,5)	3394
	Enseignement supérieur	87,3	(85,4-89,2)	88,5	(86,6-90,1)	4197
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	86,2	(83,4-89,1)	86,6	(83,5-89,1)	1185
	Brabant Flamand	85,1	(79,6-90,6)	85,1	(78,8-89,8)	636
	Flandre Occidentale	89,5	(86,3-92,7)	89,6	(86,0-92,4)	752
	Flandre Orientale	89,2	(85,5-92,9)	89,4	(85,1-92,5)	764
	Limbourg	87,5	(83,2-91,8)	87,7	(82,9-91,3)	547
	Bruxelles	75,1	(72,8-77,3)	75,8	(73,6-78,0)	3311
	Brabant Wallon	80,1	(72,9-87,3)	80,1	(71,8-86,4)	377
	Hainaut	82,7	(80,0-85,5)	83,1	(80,2-85,6)	1541
	Liège	81,8	(77,9-85,6)	82,1	(78,0-85,6)	888
	Luxembourg	83,1	(77,4-88,9)	83,8	(77,3-88,7)	356
	Namur	88,1	(84,0-92,2)	88,5	(83,9-92,0)	594
	Communauté Germanophone	89,1	(83,2-95,0)	88,8	(81,3-93,5)	239
ANNEE D'ENQUETE	2004	74,3	(72,8-75,7)	74,6	(73,2-76,0)	12722
	2008	84,8	(83,6-85,9)	85,0	(83,8-86,1)	11190

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population totale



Pourcentage de la population qui mange des légumes (excepté les pommes de terre et les jus de légumes) chaque jour - Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone

NH03_1		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	86,7	(77,9-95,4)	99,1	(98,3-99,6)	105
	Femme	91,0	(84,8-97,1)	99,5	(99,0-99,8)	134
GROUPE D'AGE	0 - 24	79,6	(65,5-93,6)	79,5	(62,9-89,9)	55
	25 - 44	86,2	(72,6-99,7)	86,1	(67,6-94,9)	42
	45 - 64	96,6	(91,5-100,0)	96,6	(86,4-99,2)	57
	65 +	94,2	(86,2-100,0)	94,0	(78,7-98,5)	85
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	89,4	(78,8-99,9)	99,4	(98,3-99,8)	56
	Secondaire inférieur	97,1	(91,1-100,0)	99,8	(98,4-100,0)	57
	Secondaire supérieur	74,4	(54,2-94,6)	98,4	(96,3-99,4)	53
	Enseignement supérieur	98,6	(95,7-100,0)	99,9	(99,4-100,0)	47
ANNEE D'ENQUETE	2004	78,4	(68,8-88,0)	79,5	(70,2-86,5)	269
	2008	89,1	(83,2-95,0)	89,6	(82,1-94,2)	239

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population totale



Consommation de tabac (TA)

En 2008, 18% des habitants âgés de 15 ans et plus en Communauté Germanophone fument au quotidien.

Les femmes sont proportionnellement moins nombreuses (15%) que les hommes (23%) à fumer quotidiennement, mais la différence n'est pas significative.

L'usage du tabac diminue en fonction de l'âge puisqu'en Communauté Germanophone, 31% des jeunes (15-24 ans) fument tous les jours, contre 26% des 25-44 ans, 17% des 45-64 ans et 6% des personnes de 65 ans et plus.

Le tabagisme journalier semble plus courant dans les strates sociales favorisées: alors que moins de 8% des personnes ayant tout au plus un diplôme du secondaire inférieur fument tous les jours, ils sont 28% à le faire dans le groupe ayant complété le secondaire supérieur, et 17% dans le groupe ayant bénéficié de l'enseignement supérieur.

Ce pourcentage s'avère être moins élevé que ceux observés dans la plupart des provinces flamandes, mais la différence n'est pas significative.

La prévalence du tabagisme quotidien tend à diminuer au cours du temps, et ce, de manière plus marquée entre 2004 (25%) et 2008 (18%), mais cette évolution n'est pas statistiquement significative.



Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) qui fume quotidiennement,
Enquête de santé 2008 – Belgique

TA05_3		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	23,6	(21,6-25,5)	21,7	(19,8-23,7)	3504
	Femme	17,7	(16,0-19,4)	16,4	(14,9-18,1)	4089
GROUPE D'AGE	15 - 24	18,8	(15,4-22,2)	18,6	(15,4-22,3)	908
	25 - 44	24,0	(21,5-26,5)	24,0	(21,6-26,6)	2362
	45 - 64	24,1	(21,7-26,5)	24,0	(21,6-26,4)	2348
	65 +	9,1	(6,7-11,5)	9,1	(7,0-11,8)	1975
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	22,0	(18,0-26,0)	29,4	(24,5-34,7)	955
	Secondaire inférieur	29,1	(24,7-33,5)	30,0	(25,4-34,9)	1204
	Secondaire supérieur	25,1	(22,5-27,8)	21,9	(19,5-24,6)	2351
	Enseignement supérieur	13,1	(11,3-14,9)	10,1	(8,6-11,7)	2906
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	21,2	(17,3-25,0)	19,5	(16,0-23,5)	894
	Brabant Flamand	14,9	(9,8-20,0)	13,5	(9,5-19,0)	509
	Flandre Occidentale	20,1	(15,9-24,3)	18,9	(15,2-23,3)	583
	Flandre Orientale	18,4	(14,0-22,8)	16,8	(13,1-21,3)	572
	Limbourg	15,4	(10,8-20,1)	13,7	(10,0-18,6)	435
	Bruxelles	22,3	(20,0-24,6)	20,1	(17,9-22,4)	1941
	Brabant Wallon	24,2	(16,0-32,4)	22,7	(15,6-31,8)	240
	Hainaut	25,2	(21,7-28,6)	23,2	(20,1-26,7)	958
	Liège	25,3	(20,4-30,3)	23,9	(19,4-29,1)	670
	Luxembourg	19,7	(13,9-25,4)	18,0	(13,2-24,0)	239
	Namur	19,6	(13,5-25,6)	17,9	(12,8-24,5)	369
Communauté Germanophone	17,9	(10,5-25,3)	17,5	(11,3-26,1)	183	
ANNEE D'ENQUETE	1997	25,5	(24,0-27,0)	22,4	(21,0-23,8)	8223
	2001	24,1	(22,8-25,4)	22,3	(21,1-23,6)	9327
	2004	23,7	(22,3-25,1)	21,8	(20,5-23,2)	9105
	2008	20,5	(19,1-21,9)	19,0	(17,7-20,4)	7593

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



**Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) qui fume quotidiennement,
Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone**

TA05_3		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	22,6	(11,3-33,8)	2,6	(1,4-4,8)	79
	Femme	14,7	(6,1-23,3)	1,5	(0,8-2,8)	104
GROUPE D'AGE	15 - 24	30,6	(5,5-55,7)	32,5	(13,9-59,1)	23
	25 - 44	26,4	(7,4-45,5)	27,2	(12,4-49,6)	37
	45 - 64	17,0	(6,0-27,9)	17,0	(8,7-30,7)	54
	65 +	5,7	(0,0-12,9)	5,7	(1,5-19,1)	69
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	6,0	(0,0-12,5)	0,7	(0,2-2,8)	48
	Secondaire inférieur	7,8	(0,0-16,4)	0,7	(0,2-2,5)	45
	Secondaire supérieur	28,5	(11,9-45,1)	2,9	(1,3-6,4)	37
	Enseignement supérieur	16,7	(2,4-31,0)	1,5	(0,5-4,2)	37
ANNEE D'ENQUETE	1997	21,6	(14,0-29,2)	19,8	(13,4-28,3)	242
	2001	25,7	(15,1-36,3)	23,8	(15,3-35,2)	216
	2004	24,8	(16,3-33,4)	22,4	(15,2-31,8)	183
	2008	17,9	(10,5-25,3)	17,1	(11,1-25,4)	183

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Consommation d'alcool (AL)

Buveurs quotidiens

En 2008, 6,7% des habitants âgés de 15 ans et plus de la Communauté Germanophone ont consommé quotidiennement de l'alcool au cours des 12 mois précédant l'enquête.

La différence entre les femmes (5,5%) et les hommes (8,5%) à ce sujet n'est pas significative.

Par ailleurs, l'usage quotidien d'alcool semble plus élevé chez les jeunes de 15-24 ans (7,8%) en Communauté Germanophone par rapport aux jeunes du reste du pays (2,7%). Il faut toutefois considérer ces chiffres avec précaution, vu le petit nombre de jeunes interrogés en Communauté Germanophone (N=23). La prévalence progresse avec l'âge: c'est après 65 ans que la consommation quotidienne d'alcool est la plus courante (ici, 15% des personnes de cet âge). Cette progression n'est toutefois pas statistiquement significative.

La consommation quotidienne d'alcool ne varie pas de manière significative en fonction du niveau d'éducation.

Le pourcentage observé en Communauté Germanophone s'avère moins élevé que ceux obtenus dans les provinces du Brabant Flamand (15%), du Brabant Wallon (21%) et du Hainaut (15%).

La prévalence de l'usage quotidien d'alcool semble avoir doublé en 2008 par rapport aux années d'enquêtes antérieures (1997 – 2004), mais cette différence n'est pas significative.

La surconsommation d'alcool

La surconsommation d'alcool, définie selon l'OMS comme étant une consommation de plus de 21 verres de boissons alcoolisées par semaine pour les hommes et plus de 14 verres pour les femmes, touche quelque 6% de la population en Communauté Germanophone.

Dans la Communauté Germanophone, la surconsommation d'alcool concerne tant les femmes (5,5%) que les hommes (5,6%).

Comme pour l'indicateur précédent, la proportion des sur consommateurs est étonnamment élevée chez les jeunes (22% des 15-24 ans) par rapport à la proportion nationale (7% des jeunes du même âge), mais aussi par rapport aux autres tranches d'âge dans la Communauté (maximum 3% au-delà de 24 ans). On ne peut toutefois pas exclure l'existence d'un biais de sélection, vu le petit nombre d'effectifs interrogés.

Aussi, la distribution par niveau d'éducation est-elle peu conforme à ce qui est habituellement trouvé. Les sur consommateurs semblent ici être plus nombreux parmi les moins éduqués (11%) ou les détenteurs d'un diplôme du secondaire supérieur (8,6%). Cette information doit toutefois être interprétée avec prudence en raison du petit nombre de sujets.

Le pourcentage observé en Communauté Germanophone n'est pas différent des résultats dans les provinces belges.

Enfin, la surconsommation d'alcool tend à augmenter légèrement au cours du temps (de 2% à 6%).



L'hyper alcoolisation (binge drinking) hebdomadaire

Le fait de boire 6 verres ou plus de boissons alcoolisées au cours d'une occasion (hyper-alcoolisation) au moins une fois par semaine est une habitude qui concerne 9% des habitants de la Communauté Germanophone

L'hyper alcoolisation hebdomadaire est plus fréquente parmi les hommes (12%) que parmi les femmes (6%). Les jeunes de 15-24 ans sont les plus nombreux à s'adonner à une hyper-alcoolisation chaque semaine (41%), alors que cette pratique concerne tout au plus 4% des personnes des groupes de personnes plus âgées.

La proportion de personnes qui s'adonne à l'hyper alcoolisation varie avec le niveau d'éducation. L'hyper alcoolisation est plus fréquente parmi les moins éduqués (20% la pratiquent) ou les détenteurs d'un diplôme du secondaire supérieur (13%). L'hyper alcoolisation serait inexistante dans la classe d'éducation supérieure. Seule la différence entre les deux catégories extrêmes est significative.

Le pourcentage observé en Communauté Germanophone n'est pas différent des résultats dans les provinces belges.



Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) qui a bu de l'alcool quotidiennement au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2008 - Belgique

AL01_3		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	15,6	(14,0-17,2)	12,2	(10,7-13,9)	3495
	Femme	8,8	(7,6-9,9)	6,4	(5,5-7,4)	4078
GROUPE D'AGE	15 - 24	2,7	(1,4-4,1)	2,6	(1,6-4,1)	901
	25 - 44	5,3	(4,2-6,4)	5,1	(4,1-6,2)	2351
	45 - 64	17,8	(15,7-19,9)	17,1	(15,1-19,3)	2343
	65 +	20,3	(17,3-23,2)	20,2	(17,4-23,4)	1978
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	11,4	(8,7-14,2)	5,5	(4,1-7,3)	945
	Secondaire inférieur	12,8	(9,9-15,7)	7,1	(5,5-9,1)	1204
	Secondaire supérieur	12,0	(10,0-14,0)	9,1	(7,5-10,9)	2342
	Enseignement supérieur	11,6	(10,0-13,2)	9,9	(8,4-11,6)	2902
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	9,1	(6,9-11,3)	6,4	(4,9-8,4)	890
	Brabant Flamand	15,4	(11,3-19,5)	11,2	(8,5-14,6)	510
	Flandre Occidentale	13,9	(10,4-17,5)	9,9	(7,4-13,1)	579
	Flandre Orientale	12,1	(8,4-15,8)	8,5	(6,1-11,8)	575
	Limbourg	6,6	(3,4-9,7)	4,5	(2,7-7,5)	435
	Bruxelles	11,4	(9,8-13,0)	9,5	(8,0-11,2)	1928
	Brabant Wallon	20,6	(11,7-29,5)	16,6	(10,5-25,1)	239
	Hainaut	14,7	(11,9-17,5)	10,9	(8,7-13,5)	964
	Liège	12,2	(9,0-15,5)	8,8	(6,6-11,7)	666
	Luxembourg	9,4	(4,3-14,6)	7,5	(4,0-13,6)	237
	Namur	13,1	(8,8-17,3)	10,0	(6,7-14,5)	365
	Communauté Germanophone	6,7	(1,0-12,4)	4,1	(1,6-9,7)	185
ANNEE D'ENQUETE	1997	7,7	(6,8-8,6)	6,2	(5,5-7,1)	8259
	2001	9,6	(8,8-10,4)	7,3	(6,6-8,0)	9413
	2004	9,2	(8,4-10,0)	6,9	(6,2-7,6)	9531
	2008	12,0	(11,0-13,1)	9,0	(8,1-9,9)	7573

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) qui a bu de l'alcool quotidiennement au cours des 12 derniers mois - Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone

AL01_3		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	8,5	(1,9-15,0)	0,7	(0,3-1,7)	80
	Femme	5,5	(0,0-12,0)	0,4	(0,2-1,0)	105
GROUPE D'AGE	15 - 24	7,8	(0,0-21,8)	8,2	(1,4-35,7)	23
	25 - 44	1,9	(0,0-5,8)	2,0	(0,3-12,6)	37
	45 - 64	3,3	(0,0-7,5)	3,3	(1,0-10,4)	56
	65 +	14,7	(0,0-33,3)	14,9	(3,8-43,5)	69
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	3,5	(0,0-7,8)	0,0	(0,0-0,0)	49
	Secondaire inférieur	13,3	(0,0-33,4)	0,0	(0,0-0,1)	46
	Secondaire supérieur	6,8	(0,0-15,9)	0,0	(0,0-0,1)	37
	Enseignement supérieur	2,8	(0,0-8,5)	0,0	(0,0-0,1)	37
ANNEE D'ENQUETE	1997	3,3	(0,0-6,9)	2,6	(0,9-7,5)	244
	2001	3,4	(0,9-5,8)	2,2	(1,0-4,6)	222
	2004	3,2	(0,0-6,5)	2,0	(0,7-5,7)	199
	2008	6,7	(1,0-12,4)	4,3	(1,6-10,7)	185

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



**Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) qui s'adonne à une surconsommation hebdomadaire d'alcool (15+ pour les femmes; 22+ pour les hommes),
Enquête de santé 2008 - Belgique**

AL02_6		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	10,1	(8,8-11,4)	9,3	(8,1-10,7)	3354
	Femme	5,9	(4,9-7,0)	5,6	(4,7-6,7)	3941
GROUPE D'AGE	15 - 24	7,3	(4,9-9,8)	7,1	(5,1-9,8)	864
	25 - 44	6,4	(5,1-7,7)	6,3	(5,1-7,7)	2287
	45 - 64	11,1	(9,4-12,8)	10,8	(9,2-12,6)	2254
	65 +	5,3	(3,8-6,8)	5,3	(4,0-7,0)	1890
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	5,9	(3,9-8,0)	5,8	(4,0-8,3)	906
	Secondaire inférieur	7,5	(5,2-9,8)	6,6	(4,9-8,9)	1144
	Secondaire supérieur	7,9	(6,4-9,5)	7,2	(5,8-8,9)	2261
	Enseignement supérieur	8,4	(6,9-9,8)	7,6	(6,3-9,2)	2808
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	7,3	(5,2-9,4)	6,6	(4,9-8,9)	864
	Brabant Flamand	7,7	(4,3-11,2)	7,1	(4,5-11,1)	502
	Flandre Occidentale	10,5	(7,6-13,5)	9,7	(7,3-12,8)	551
	Flandre Orientale	7,9	(5,2-10,6)	7,0	(4,9-10,0)	549
	Limbourg	5,7	(2,9-8,5)	5,0	(3,0-8,2)	422
	Bruxelles	6,7	(5,4-7,9)	6,3	(5,2-7,6)	1869
	Brabant Wallon	8,8	(3,6-14,0)	8,4	(4,7-14,4)	230
	Hainaut	8,5	(6,2-10,9)	7,7	(5,8-10,2)	928
	Liège	9,1	(6,0-12,2)	8,2	(5,8-11,5)	630
	Luxembourg	6,4	(2,5-10,3)	6,0	(3,4-10,7)	229
	Namur	7,1	(3,6-10,7)	6,6	(3,9-10,8)	346
	Communauté Germanophone	5,6	(0,6-10,5)	5,1	(2,0-12,2)	175
ANNEE D'ENQUETE	1997	7,0	(6,2-7,8)	6,3	(5,5-7,1)	8061
	2001	9,3	(8,4-10,1)	8,5	(7,7-9,4)	8817
	2004	9,0	(8,1-9,8)	8,2	(7,4-9,0)	9051
	2008	7,9	(7,0-8,8)	7,2	(6,4-8,1)	7295

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence), Population de 15 ans et plus



**Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) qui s'adonne à une surconsommation hebdomadaire d'alcool (15+ pour les femmes; 22+ pour les hommes),
Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone**

AL02_6		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	5,6	(0,4-10,9)			73
	Femme	5,5	(0,0-13,1)			102
GROUPE D'AGE	15 - 24	22,2	(0,0-46,8)	22,7	(8,5-48,3)	23
	25 - 44	2,8	(0,0-7,1)	2,8	(0,6-11,8)	37
	45 - 64	2,9	(0,0-7,3)	2,9	(0,6-12,1)	52
	65 +	1,6	(0,0-4,8)	1,6	(0,2-11,5)	63
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	11,4	(0,0-30,1)			44
	Secondaire inférieur	4,4	(0,0-11,1)			42
	Secondaire supérieur	8,6	(0,0-17,6)			37
	Enseignement supérieur	0,0				36
ANNEE D'ENQUETE	1997	2,0	(0,0-4,4)	0,3	(0,1-1,2)	235
	2001	5,0	(2,0-8,0)	0,8	(0,3-1,6)	193
	2004	7,1	(3,1-11,1)	1,3	(0,7-2,6)	188
	2008	5,6	(0,6-10,5)	1,0	(0,4-2,5)	175

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) qui s'adonne à une hyper alcoolisation (6+ verres/occasion) au moins une fois par semaine, Enquête de santé 2008 - Belgique

AL03_2		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	12,8	(11,3-14,4)	11,8	(10,4-13,4)	3469
	Femme	3,7	(2,8-4,6)	3,4	(2,7-4,4)	4052
GROUPE D'AGE	15 - 24	12,0	(9,1-15,0)	10,3	(7,8-13,5)	896
	25 - 44	7,5	(6,1-8,9)	6,4	(5,2-7,9)	2342
	45 - 64	9,7	(8,0-11,3)	8,2	(6,8-9,9)	2327
	65 +	3,6	(2,3-4,9)	3,2	(2,2-4,6)	1956
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	8,3	(5,1-11,5)	8,8	(5,9-13,0)	941
	Secondaire inférieur	9,0	(6,6-11,4)	7,6	(5,8-10,0)	1196
	Secondaire supérieur	8,1	(6,4-9,7)	6,1	(4,7-7,8)	2322
	Enseignement supérieur	7,6	(6,3-8,9)	5,6	(4,5-6,8)	2882
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	9,7	(7,1-12,3)	7,6	(5,8-9,9)	881
	Brabant Flamand	7,8	(4,8-10,9)	6,4	(4,2-9,8)	506
	Flandre Occidentale	11,2	(8,1-14,2)	9,1	(6,7-12,3)	574
	Flandre Orientale	9,1	(5,9-12,2)	7,1	(4,8-10,4)	573
	Limbourg	4,8	(2,5-7,0)	3,5	(2,1-5,8)	431
	Bruxelles	6,2	(4,8-7,5)	4,8	(3,7-6,1)	1916
	Brabant Wallon	5,0	(2,0-8,0)	4,1	(2,1-7,6)	238
	Hainaut	6,5	(4,5-8,5)	5,1	(3,7-7,0)	958
	Liège	7,4	(4,8-9,9)	5,8	(4,0-8,4)	663
	Luxembourg	5,3	(2,2-8,5)	4,1	(2,3-7,2)	235
	Namur	9,6	(5,1-14,0)	7,7	(4,6-12,6)	361
	Communauté Germanophone	8,8	(2,3-15,3)	7,8	(3,6-16,3)	185
ANNEE D'ENQUETE	2008	8,1	(7,2-9,0)	6,4	(5,5-7,4)	7521

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) qui s'adonne à une hyper alcoolisation (6+ verres/occasion) au moins une fois par semaine, Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone

AL03_2		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	12,3	(4,1-20,5)			80
	Femme	6,4	(0,0-14,0)			105
GROUPE D'AGE	15 - 24	41,0	(8,7-73,3)	45,9	(18,2-76,4)	23
	25 - 44	4,3	(0,0-11,2)	4,0	(0,8-16,9)	37
	45 - 64	3,9	(0,0-8,4)	3,4	(0,9-11,3)	56
	65 +	1,4	(0,0-4,3)	1,3	(0,2-8,7)	69
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	20,3	(0,0-43,1)			49
	Secondaire inférieur	5,5	(0,0-13,5)			46
	Secondaire supérieur	13,1	(2,5-23,7)			37
	Enseignement supérieur	0,0				37
ANNEE D'ENQUETE	2008	8,8	(2,3-15,3)			185

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Vaccination (VA)

Tétanos

En Communauté Germanophone en 2008, 62% des personnes âgées de 15 ans et plus déclarent avoir été vaccinées contre le tétanos au cours des dix dernières années.

Il n'y a pas de différence significative à ce sujet entre les hommes et les femmes; on remarque par contre que les personnes âgées de 65 ans et plus sont moins bien vaccinées (29%). De même, le taux de vaccination est plus faible (42%) chez les personnes avec au maximum un niveau d'éducation primaire.

Le pourcentage de personnes âgées de 15 ans et plus en Communauté Germanophone qui déclarent avoir été vaccinées contre le tétanos au cours des dix dernières années:

- est significativement plus élevé que dans la province de Flandre Orientale (48%) mais ne diffère pas significativement par contre de celui des autres provinces;
- n'a pas varié de manière significative au cours des dix dernières années (61% en 1997 et 62% en 2008).

Grippe

En Communauté Germanophone en 2008, 21% des personnes âgées de 15 ans et plus déclarent avoir été vaccinées contre la grippe au cours des douze derniers mois.

Il n'y a pas de différence significative à ce sujet entre les hommes et les femmes; on remarque par contre que le taux de vaccination est plus élevé (56%) chez les personnes les personnes âgées de 65 ans et plus.

Le taux de vaccination contre la grippe ne varie pas en fonction du niveau d'éducation.

Le pourcentage de personnes âgées de 15 ans et plus en Communauté Germanophone qui déclarent avoir été vaccinées contre la grippe au cours des douze derniers mois:

- ne diffère pas de manière significative de celui observé dans les différents provinces belges, sauf pour ce qui est de la province d'Anvers où le taux est plus élevé (32%);
- n'a pas varié de manière significative au cours des dix dernières années (12% en 1997 et 21% en 2008).



Pourcentage de la population vaccinée contre le Tétanos au cours des dix dernières années, Enquête de santé 2008 - Belgique

VA_1		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	67,1	(64,4-69,7)	68,7	(66,0-71,3)	2305
	Femme	57,3	(54,6-59,9)	59,3	(56,3-62,2)	2607
GROUPE D'AGE	15 - 24	82,4	(78,0-86,8)	82,5	(77,7-86,4)	592
	25 - 44	72,1	(68,8-75,4)	72,3	(68,8-75,5)	1387
	45 - 64	60,7	(57,4-64,0)	60,5	(57,1-63,8)	1433
	65 +	34,5	(30,4-38,6)	34,9	(30,8-39,2)	1500
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	44,2	(38,4-50,0)	56,6	(49,8-63,1)	745
	Secondaire inférieur	53,6	(47,8-59,4)	61,0	(55,1-66,6)	801
	Secondaire supérieur	63,6	(59,9-67,3)	63,8	(60,0-67,5)	1461
	Enseignement supérieur	69,7	(66,5-73,0)	67,7	(64,1-71,1)	1774
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	56,6	(50,6-62,6)	58,3	(52,4-64,0)	562
	Brabant Flamand	71,5	(64,1-78,9)	74,6	(66,7-81,2)	321
	Flandre Occidentale	54,8	(48,0-61,5)	57,2	(50,4-63,7)	402
	Flandre Orientale	47,7	(40,6-54,8)	48,9	(41,5-56,3)	343
	Limbourg	69,9	(62,6-77,3)	71,2	(63,7-77,6)	257
	Bruxelles	62,7	(59,2-66,2)	62,7	(58,7-66,6)	1333
	Brabant Wallon	74,3	(64,0-84,6)	78,3	(67,2-86,4)	141
	Hainaut	65,8	(61,4-70,3)	67,9	(62,9-72,5)	649
	Liège	71,7	(65,8-77,7)	74,8	(68,4-80,4)	385
	Luxembourg	69,4	(59,3-79,6)	71,1	(60,0-80,2)	141
	Namur	70,8	(63,4-78,1)	73,0	(64,6-80,0)	280
	Communauté Germanophone	62,3	(49,0-75,5)	67,8	(55,0-78,4)	98
ANNEE D'ENQUETE	1997	67,7	(66,1-69,4)	66,9	(65,1-68,6)	8115
	2001	64,3	(62,9-65,8)	66,2	(64,7-67,6)	9599
	2004	60,4	(58,9-61,9)	61,6	(60,0-63,3)	10199
	2008	62,1	(60,0-64,2)	64,6	(62,4-66,8)	4912

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Pourcentage de la population vaccinée contre le Tétanos au cours des dix dernières années, Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone

VA_1		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	67,4	(47,6-87,1)	96,1	(87,2-98,9)	38
	Femme	58,9	(41,4-76,3)	94,0	(88,3-97,0)	60
GROUPE D'AGE	15 - 24	100	(100,0-100,0)	100	(100,0-100,0)	12
	25 - 44	61,2	(21,2-100,0)	62,6	(28,2-87,7)	10
	45 - 64	67,9	(50,9-84,9)	68,3	(50,3-82,2)	40
	65 +	28,7	(12,4-45,0)	29,9	(16,4-48,2)	36
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	42,5	(15,7-69,3)	82,7	(52,4-95,4)	34
	Secondaire inférieur	66,9	(43,4-90,4)	96,9	(90,8-99,0)	24
	Secondaire supérieur	79,4	(45,9-100,0)	97,8	(88,2-99,6)	17
	Enseignement supérieur	60,8	(18,3-100,0)	93,9	(76,6-98,6)	20
ANNEE D'ENQUETE	1997	61,1	(53,1-69,1)	58,6	(48,8-67,8)	233
	2001	68,0	(59,8-76,1)	72,9	(65,0-79,6)	224
	2004	62,5	(54,6-70,4)	66,9	(58,3-74,5)	213
	2008	62,3	(49,0-75,5)	70,1	(56,1-81,1)	98

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Pourcentage de la population vaccinée contre la Grippe au cours des douze derniers mois,
Enquête de santé 2008 - Belgique

VA_4		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	27,2	(24,7-29,7)	22,9	(20,4-25,6)	2495
	Femme	28,9	(26,6-31,3)	21,3	(18,7-24,1)	2988
GROUPE D'AGE	15 - 24	6,4	(3,8-9,1)	6,4	(4,3-9,6)	626
	25 - 44	12,4	(9,8-15,0)	12,4	(10,0-15,2)	1500
	45 - 64	27,9	(24,6-31,2)	27,9	(24,7-31,3)	1548
	65 +	64,7	(61,0-68,4)	64,8	(61,0-68,5)	1809
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	48,6	(43,1-54,1)	25,8	(20,1-32,5)	894
	Secondaire inférieur	37,3	(32,2-42,4)	23,8	(19,6-28,5)	903
	Secondaire supérieur	22,3	(19,2-25,5)	18,7	(15,9-21,8)	1577
	Enseignement supérieur	22,0	(19,1-25,0)	22,7	(19,5-26,3)	1936
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	32,5	(27,5-37,6)	27,1	(22,1-32,7)	649
	Brabant Flamand	32,4	(24,4-40,5)	26,6	(18,4-36,8)	356
	Flandre Occidentale	31,2	(25,1-37,4)	23,4	(17,8-30,0)	455
	Flandre Orientale	29,3	(23,1-35,6)	21,5	(16,6-27,3)	394
	Limbourg	26,3	(19,0-33,7)	21,5	(15,4-29,2)	283
	Bruxelles	24,1	(21,3-26,8)	20,4	(17,7-23,5)	1466
	Brabant Wallon	22,2	(12,7-31,6)	15,7	(9,7-24,2)	162
	Hainaut	21,5	(17,9-25,1)	15,6	(12,8-19,0)	716
	Liège	25,5	(19,5-31,5)	18,9	(14,5-24,4)	421
	Luxembourg	22,9	(13,9-31,9)	17,5	(10,3-28,2)	162
	Namur	29,8	(22,2-37,4)	24,9	(19,1-31,8)	313
	Communauté Germanophone	20,9	(8,7-33,1)	11,9	(6,4-21,1)	106
ANNEE D'ENQUETE	1997	15,3	(13,9-16,6)	13,5	(12,1-14,9)	8474
	2001	20,9	(19,6-22,2)	15,8	(14,7-17,0)	10012
	2004	24,5	(23,2-25,7)	19,7	(18,4-21,0)	10909
	2008	28,1	(26,2-30,0)	21,8	(20,0-23,8)	5483

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



**Pourcentage de la population vaccinée contre la Grippe au cours des douze derniers mois,
Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone**

VA_4		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	19,7	(4,8-34,5)	0,0	(0,0-0,0)	38
	Femme	21,6	(7,9-35,4)	0,0	(0,0-0,0)	68
GROUPE D'AGE	15 - 24	0,0				12
	25 - 44	0,0				11
	45 - 64	13,4	(1,4-25,5)	13,3	(5,5-29,0)	42
	65 +	56,1	(30,4-81,7)	55,5	(31,0-77,6)	41
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	32,3	(8,7-56,0)			39
	Secondaire inférieur	25,7	(0,0-56,8)			25
	Secondaire supérieur	0,0				18
	Enseignement supérieur	18,7	(0,0-52,8)			21
ANNEE D'ENQUETE	1997	12,2	(7,2-17,2)	11,1	(6,9-17,5)	241
	2001	19,2	(12,3-26,1)	12,8	(8,1-19,6)	236
	2004	18,9	(12,4-25,3)	11,8	(6,9-19,5)	228
	2008	20,9	(8,7-33,1)	9,3	(4,5-18,4)	106

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Prévention cardiovasculaire (PR)

Cholestérol

En Communauté Germanophone en 2008, 63% des personnes âgées de 15 ans et plus déclarent que leur taux de cholestérol dans le sang a été mesuré au cours des cinq dernières années.

Il n'y a pas de différence significative à ce sujet entre les hommes et les femmes; on remarque par contre que le taux de couverture augmente avec l'âge pour atteindre 85% chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Le taux de couverture ne varie pas de manière significative en fonction du niveau d'éducation.

Le pourcentage de personnes âgées de 15 ans et plus en Communauté Germanophone qui déclarent que leur cholestérol a été mesuré au cours des cinq dernières années:

- n'est pas significativement différent de celui observé dans les provinces belges;
- semble avoir augmenté (mais pas de manière significative) entre 1997 et 2001 et être stable depuis lors.

Glycémie

En Communauté Germanophone en 2008, 63% des personnes âgées de 15 ans et plus déclarent que leur taux de sucre dans le sang a été mesuré au cours des cinq dernières années.

Le taux de couverture est plus élevé chez les femmes (72%) que chez les hommes (52%). Ce taux augmente aussi avec l'âge pour atteindre 80% chez les personnes âgées de 65 ans ou plus. Le taux de couverture ne varie pas de manière significative en fonction du niveau d'éducation.

Le pourcentage de personnes âgées de 15 ans et plus en Communauté Germanophone qui déclarent que leur glycémie a été mesurée au cours des cinq dernières années:

- n'est pas significativement différent de celui observé dans les provinces belges;
- semble avoir augmenté (mais pas de manière significative) entre 2004 et 2008.



Pourcentage de la population (âgée de 15 ans et plus) dont le cholestérol sanguin a été mesuré au cours des 5 dernières années, Enquête de santé 2008 - Belgique

PR_1		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	62,6	(60,3-64,9)	62,9	(60,3-65,5)	3199
	Femme	67,8	(65,7-69,9)	68,7	(66,2-71,0)	3774
GROUPE D'AGE	15 - 24	15,8	(12,5-19,1)	15,8	(12,8-19,3)	794
	25 - 44	52,7	(49,6-55,7)	52,6	(49,6-55,6)	2112
	45 - 64	81,1	(79,0-83,3)	81,2	(79,0-83,2)	2242
	65 +	89,8	(87,7-91,8)	89,7	(87,4-91,6)	1825
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	74,0	(69,5-78,5)	60,2	(53,1-66,9)	853
	Secondaire inférieur	70,8	(66,8-74,8)	61,2	(56,3-65,9)	1106
	Secondaire supérieur	61,5	(58,5-64,6)	64,3	(60,9-67,6)	2170
	Enseignement supérieur	64,3	(61,6-67,0)	70,3	(67,2-73,1)	2691
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	62,4	(58,0-66,8)	62,6	(57,8-67,2)	830
	Brabant Flamand	70,1	(64,4-75,9)	69,7	(62,6-76,0)	479
	Flandre Occidentale	66,6	(61,5-71,7)	66,0	(60,0-71,6)	532
	Flandre Orientale	63,9	(58,2-69,5)	63,0	(56,6-69,0)	516
	Limbourg	68,7	(61,6-75,7)	71,6	(63,7-78,4)	405
	Bruxelles	62,9	(60,3-65,6)	67,6	(64,4-70,8)	1767
	Brabant Wallon	61,3	(51,9-70,7)	58,9	(49,0-68,2)	218
	Hainaut	67,0	(63,2-70,8)	67,8	(63,5-71,8)	896
	Liège	64,9	(59,9-69,9)	64,3	(58,4-69,9)	608
	Luxembourg	65,4	(56,7-74,1)	70,2	(60,3-78,5)	215
	Namur	64,8	(57,4-72,2)	66,1	(58,3-73,1)	343
Communauté Germanophone	63,2	(53,1-73,3)	56,7	(44,1-68,5)	164	
ANNEE D'ENQUETE	1997	55,7	(54,0-57,4)	59,4	(57,4-61,5)	7473
	2001	63,2	(61,7-64,8)	63,5	(61,8-65,1)	8332
	2004	61,6	(59,9-63,2)	61,8	(59,9-63,6)	8422
	2008	65,3	(63,6-67,0)	65,6	(63,8-67,3)	6973

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Pourcentage de la population (âgée de 15 ans et plus) dont le cholestérol sanguin a été mesuré au cours des 5 dernières années, Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone

PR_1		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	62,7	(48,4-77,1)	53,9	(35,5-71,3)	73
	Femme	63,6	(51,3-75,9)	61,0	(44,6-75,3)	91
GROUPE D'AGE	15 - 24	12,5	(0,0-29,1)	12,0	(3,3-35,2)	21
	25 - 44	49,1	(25,6-72,7)	47,9	(27,4-69,1)	31
	45 - 64	74,0	(59,5-88,6)	74,2	(57,3-86,0)	49
	65 +	84,6	(73,8-95,4)	84,5	(71,0-92,4)	63
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	68,7	(44,9-92,5)	67,0	(38,8-86,7)	44
	Secondaire inférieur	78,9	(62,2-95,5)	66,3	(39,6-85,5)	42
	Secondaire supérieur	54,2	(36,0-72,5)	53,9	(31,6-74,7)	33
	Enseignement supérieur	60,8	(37,0-84,7)	59,2	(30,6-82,7)	31
ANNEE D'ENQUETE	1997	51,9	(42,2-61,7)	56,7	(45,4-67,3)	221
	2001	64,7	(56,7-72,7)	63,9	(56,0-71,0)	193
	2004	60,8	(50,4-71,3)	59,7	(48,2-70,2)	165
	2008	63,2	(53,1-73,3)	58,7	(46,6-69,8)	164

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Pourcentage de la population (âgée de 15 ans et plus) dont la glycémie a été mesurée au cours des 3 dernières années, Enquête de santé 2008 - Belgique

PR_3		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	54,3	(51,9-56,7)	52,7	(50,1-55,3)	3018
	Femme	59,7	(57,4-62,0)	58,2	(55,5-60,8)	3606
GROUPE D'AGE	15 - 24	21,9	(17,4-26,3)	21,9	(17,8-26,5)	734
	25 - 44	45,9	(42,8-49,0)	45,7	(42,6-48,8)	1989
	45 - 64	68,4	(65,7-71,1)	68,4	(65,7-71,1)	2127
	65 +	77,1	(73,6-80,6)	77,0	(73,3-80,3)	1774
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	65,2	(59,9-70,5)	51,9	(45,6-58,1)	845
	Secondaire inférieur	59,0	(54,0-64,0)	49,7	(43,9-55,4)	1051
	Secondaire supérieur	51,9	(48,8-55,0)	51,5	(48,2-54,8)	2081
	Enseignement supérieur	58,6	(55,7-61,5)	61,7	(58,6-64,8)	2496
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	51,7	(47,0-56,5)	49,0	(43,5-54,5)	773
	Brabant Flamand	60,0	(53,3-66,7)	57,3	(50,2-64,1)	452
	Flandre Occidentale	60,7	(55,5-65,9)	58,8	(52,8-64,5)	508
	Flandre Orientale	49,5	(43,4-55,7)	46,8	(40,5-53,2)	490
	Limbourg	60,7	(53,5-67,8)	59,7	(51,9-67,0)	385
	Bruxelles	60,3	(57,5-63,0)	62,7	(59,6-65,7)	1678
	Brabant Wallon	52,4	(42,1-62,7)	49,2	(39,0-59,4)	211
	Hainaut	62,1	(58,3-65,9)	61,3	(57,3-65,2)	867
	Liège	57,6	(52,5-62,7)	55,1	(49,5-60,5)	577
	Luxembourg	66,1	(58,0-74,1)	68,0	(59,4-75,5)	204
	Namur	59,3	(52,3-66,4)	57,6	(50,1-64,7)	319
	Communauté Germanophone	62,9	(51,8-74,0)	57,6	(45,7-68,8)	160
ANNEE D'ENQUETE	2004	50,4	(48,8-52,1)	48,9	(47,1-50,7)	8018
	2008	57,2	(55,3-59,0)	55,7	(53,7-57,6)	6624

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Pourcentage de la population (âgée de 15 ans et plus) dont la glycémie a été mesurée au cours des 3 dernières années, Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone

PR_3		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	51,9	(37,0-66,7)	42,7	(26,6-60,4)	73
	Femme	71,5	(57,7-85,4)	69,7	(53,7-82,0)	87
GROUPE D'AGE	15 - 24	25,2	(3,1-47,4)	21,8	(8,9-44,4)	18
	25 - 44	50,3	(29,8-70,8)	47,6	(28,8-67,1)	30
	45 - 64	68,8	(51,8-85,8)	69,5	(50,6-83,5)	50
	65 +	80,5	(68,2-92,7)	81,2	(66,0-90,6)	62
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	63,3	(41,7-84,9)	51,7	(26,7-75,9)	43
	Secondaire inférieur	83,5	(68,4-98,7)	77,8	(51,5-92,1)	41
	Secondaire supérieur	62,7	(35,1-90,2)	62,9	(32,3-85,8)	33
	Enseignement supérieur	48,6	(20,9-76,3)	41,4	(21,9-64,0)	30
ANNEE D'ENQUETE	2004	52,2	(42,6-61,8)	51,9	(41,6-62,0)	165
	2008	62,9	(51,8-74,0)	58,4	(46,3-69,6)	160

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus





3. Consommation de soins

Contacts avec le médecin généraliste (GP)

En Communauté Germanophone en 2008, 72% de la population déclare avoir consulté un médecin généraliste au cours des douze derniers mois. Le nombre moyen de contacts est de 4,4 par an.

Il n'y a pas de différence significative à ce sujet entre les hommes et les femmes; on remarque par contre que les personnes âgées de 65 ans et plus déclarent plus souvent avoir consulté un médecin généraliste au cours des douze derniers mois (91%).

Ce pourcentage ne varie pas de manière significative en fonction du niveau d'éducation.

Le pourcentage de personnes en Communauté Germanophone qui déclarent avoir consulté un médecin généraliste au cours des douze derniers mois:

- est significativement plus bas que dans la province d'Anvers (79%), du Brabant Flamand (89%) et de Namur (82%) mais ne diffère pas significativement par contre de celui des autres provinces;
- n'a pas varié de manière significative entre 1997 et 2004, mais a diminué ensuite de manière significative, de 82% à 72% entre 2004 et 2008.



Pourcentage de la population qui déclare avoir consulté un médecin généraliste au cours des douze derniers mois, Enquête de santé 2008 - Belgique

GP03_1		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	72,3	(70,6-74,1)	75,0	(73,3-76,7)	5182
	Femme	82,8	(81,4-84,3)	84,3	(82,9-85,6)	5956
GROUPE D'AGE	0 - 24	67,9	(65,2-70,5)	68,4	(65,7-71,0)	2779
	25 - 44	73,6	(71,3-75,8)	74,0	(71,7-76,2)	2814
	45 - 64	82,6	(80,8-84,4)	83,1	(81,2-84,8)	2715
	65 +	93,8	(92,5-95,2)	93,8	(92,3-95,0)	2830
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	84,8	(81,3-88,2)	79,9	(75,0-84,0)	1518
	Secondaire inférieur	79,5	(76,4-82,6)	78,3	(75,0-81,3)	1712
	Secondaire supérieur	76,7	(74,5-78,9)	80,1	(78,0-82,1)	3384
	Enseignement supérieur	75,9	(73,9-78,0)	80,9	(78,9-82,7)	4178
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	79,0	(75,8-82,2)	81,3	(78,1-84,2)	1172
	Brabant Flamand	89,0	(85,7-92,3)	90,4	(87,0-93,1)	634
	Flandre Occidentale	76,8	(72,7-81,0)	78,5	(74,3-82,2)	751
	Flandre Orientale	79,5	(75,1-83,9)	81,5	(77,1-85,3)	764
	Limbourg	74,9	(69,3-80,5)	77,5	(71,7-82,3)	547
	Bruxelles	69,2	(67,1-71,4)	72,8	(70,5-75,0)	3308
	Brabant Wallon	66,8	(59,3-74,2)	69,3	(61,3-76,2)	375
	Hainaut	76,9	(74,1-79,7)	79,6	(76,9-82,1)	1533
	Liège	77,9	(73,9-81,8)	80,4	(76,5-83,7)	880
	Luxembourg	75,9	(68,5-83,3)	79,7	(72,3-85,6)	353
	Namur	81,6	(76,9-86,4)	84,3	(79,3-88,2)	587
	Communauté Germanophone	71,6	(62,8-80,5)	71,6	(62,2-79,4)	234
ANNEE D'ENQUETE	1997	78,6	(77,4-79,9)	81,7	(80,5-82,9)	9717
	2001	80,4	(79,2-81,5)	82,2	(81,1-83,3)	11065
	2004	78,6	(77,4-79,8)	80,4	(79,2-81,6)	11989
	2008	77,7	(76,5-79,0)	79,5	(78,3-80,7)	11138

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Total population



Pourcentage de la population qui déclare avoir consulté un médecin généraliste au cours des douze derniers mois, Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone

GP03_1		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	65,2	(51,5-79,0)	94,3	(90,5-96,7)	102
	Femme	76,4	(66,4-86,3)	96,7	(94,5-98,1)	132
GROUPE D'AGE	0 – 24	70,5	(57,3-83,7)	70,5	(56,1-81,6)	55
	25 – 44	63,0	(38,4-87,7)	62,7	(38,1-82,1)	41
	45 – 64	63,6	(47,0-80,2)	63,0	(45,8-77,4)	55
	65 +	90,9	(83,6-98,3)	90,7	(80,3-95,8)	83
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	80,8	(59,3-100,0)	95,3	(85,2-98,6)	51
	Secondaire inférieur	80,8	(68,7-92,9)	97,5	(94,6-98,9)	55
	Secondaire supérieur	63,0	(44,5-81,5)	94,8	(88,7-97,7)	54
	Enseignement supérieur	63,9	(40,9-86,8)	94,3	(86,5-97,7)	48
ANNEE D'ENQUETE	1997	75,4	(68,5-82,2)	79,2	(72,0-84,9)	282
	2001	78,1	(71,4-84,9)	80,9	(73,9-86,3)	258
	2004	82,3	(76,9-87,8)	84,5	(78,9-88,8)	251
	2008	71,6	(62,8-80,5)	72,3	(63,3-79,7)	234

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Total population



**Nombre moyen de contacts avec le médecin généraliste par an et par personne
dans la population, Enquête de santé 2008 - Belgique**

GP05_1		Moyenne brut	+ IC 95 %	Moyenne stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	3,9	(3,6-4,1)	4,0	(3,8-4,2)	5159
	Femme	5,2	(4,9-5,4)	4,9	(4,6-5,2)	5916
GROUPE D'AGE	0 - 24	2,5	(2,2-2,7)	2,5	(2,2-2,7)	2767
	25 - 44	3,2	(2,9-3,5)	3,2	(2,9-3,5)	2805
	45 - 64	5,1	(4,7-5,6)	5,1	(4,7-5,6)	2698
	65 +	9,3	(8,8-9,9)	9,3	(8,7-9,8)	2805
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	8,5	(7,5-9,5)	6,6	(5,6-7,5)	1502
	Secondaire inférieur	5,7	(5,2-6,3)	4,9	(4,4-5,4)	1707
	Secondaire supérieur	4,1	(3,8-4,4)	4,3	(3,9-4,6)	3360
	Enseignement supérieur	3,4	(3,1-3,7)	3,9	(3,7-4,2)	4162
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	4,5	(3,8-5,1)	4,4	(3,8-4,9)	1169
	Brabant Flamand	4,9	(4,2-5,6)	4,7	(4,1-5,4)	631
	Flandre Occidentale	4,4	(3,7-5,0)	4,1	(3,5-4,6)	750
	Flandre Orientale	5,1	(4,3-5,8)	4,9	(4,3-5,6)	746
	Limbourg	4,5	(3,7-5,3)	4,5	(3,8-5,3)	545
	Bruxelles	3,9	(3,5-4,2)	4,1	(3,7-4,4)	3295
	Brabant Wallon	3,8	(3,0-4,6)	3,8	(3,1-4,5)	375
	Hainaut	4,4	(3,8-5,0)	4,4	(3,9-5,0)	1515
	Liège	4,7	(4,1-5,3)	4,7	(4,1-5,2)	875
	Luxembourg	4,2	(3,3-5,1)	4,4	(3,5-5,3)	353
	Namur	5,0	(4,2-5,9)	5,0	(4,3-5,8)	587
	Communauté Germanophone	4,4	(3,5-5,4)	4,0	(3,1-4,9)	234
ANNEE D'ENQUETE	1997	4,5	(4,3-4,8)	4,9	(4,7-5,2)	10125
	2001	5,3	(5,0-5,5)	5,3	(5,1-5,5)	11811
	2004	4,5	(4,3-4,8)	4,6	(4,4-4,8)	12669
	2008	4,5	(4,3-4,7)	4,5	(4,3-4,7)	11075

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Total population



Nombre moyen de contacts avec le médecin généraliste par an et par personne dans la population, Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone

GP05_1		Moyenne brut	+ IC 95 %	Moyenne stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	4,3	(2,6-6,0)	5,0	(2,9-7,0)	102
	Femme	4,6	(3,4-5,7)	4,9	(3,6-6,2)	132
GROUPE D'AGE	0 - 24	2,9	(1,1-4,7)	2,9	(1,2-4,6)	55
	25 - 44	4,6	(1,7-7,5)	4,6	(1,8-7,4)	41
	45 - 64	4,2	(2,5-6,0)	4,2	(2,5-5,9)	55
	65 +	6,7	(5,0-8,4)	6,7	(5,0-8,4)	83
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	5,0	(2,6-7,4)	4,1	(1,6-6,6)	51
	Secondaire inférieur	5,1	(3,1-7,1)	5,7	(3,6-7,9)	55
	Secondaire supérieur	4,2	(1,9-6,5)	5,3	(3,0-7,7)	54
	Enseignement supérieur	4,0	(2,4-5,6)	4,9	(3,0-6,7)	48
ANNEE D'ENQUETE	1997	4,4	(2,8-5,9)	5,3	(3,4-7,1)	293
	2001	5,2	(1,9-8,5)	5,4	(2,2-8,6)	286
	2004	4,4	(3,3-5,5)	4,6	(3,6-5,6)	260
	2008	4,4	(3,5-5,4)	3,8	(2,7-4,9)	234

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Total population



Contacts avec le médecin spécialiste (SP)

En Communauté Germanophone en 2008, 67% de la population déclare avoir consulté un médecin spécialiste au cours des douze derniers mois. Le nombre moyen de contacts est de 2,7 par an.

Il n'y a pas de différence significative à ce sujet entre les hommes et les femmes, ni sur base de l'âge ou du niveau d'éducation.

Le pourcentage de personnes en Communauté Germanophone qui déclarent avoir consulté un médecin spécialiste au cours des douze derniers mois:

- est significativement plus élevé que dans l'ensemble des provinces belges;
- a augmenté de manière linéaire de 49% à 67% au cours des dix dernières années.



Pourcentage de la population qui a eu un contact avec un médecin spécialiste au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2008 - Belgique

SP03_1		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	41,3	(39,4-43,1)	41,3	(39,4-43,1)	5135
	Femme	55,1	(53,2-56,9)	54,7	(52,8-56,6)	5911
GROUPE D'AGE	0 - 24	39,5	(36,8-42,2)	39,6	(36,9-42,3)	2758
	25 - 44	46,7	(44,2-49,3)	46,7	(44,2-49,3)	2804
	45 - 64	52,8	(50,4-55,3)	53,0	(50,5-55,5)	2694
	65 +	59,4	(56,6-62,3)	58,5	(55,6-61,5)	2790
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	48,8	(44,7-52,9)	42,4	(38,1-46,8)	1505
	Secondaire inférieur	47,1	(43,2-51,0)	43,8	(40,0-47,7)	1697
	Secondaire supérieur	44,6	(42,2-47,0)	44,9	(42,5-47,4)	3362
	Enseignement supérieur	51,3	(49,0-53,5)	53,1	(50,8-55,4)	4153
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	44,4	(40,7-48,1)	43,9	(40,2-47,6)	1176
	Brabant Flamand	53,9	(48,4-59,4)	53,1	(47,3-58,8)	623
	Flandre Occidentale	44,8	(40,3-49,3)	44,0	(39,5-48,6)	745
	Flandre Orientale	47,5	(42,7-52,3)	46,9	(42,0-51,8)	751
	Limbourg	36,9	(31,1-42,7)	36,2	(30,6-42,2)	536
	Bruxelles	55,0	(53,0-57,1)	55,7	(53,6-57,7)	3277
	Brabant Wallon	53,4	(45,2-61,5)	53,1	(45,0-61,1)	373
	Hainaut	48,3	(45,2-51,5)	48,3	(45,1-51,4)	1528
	Liège	52,6	(48,3-56,8)	52,7	(48,4-56,9)	866
	Luxembourg	50,1	(42,4-57,8)	51,2	(43,3-59,2)	352
	Namur	53,1	(47,5-58,7)	53,4	(47,7-59,0)	584
	Communauté Germanophone	66,6	(58,3-74,8)	65,5	(56,8-73,4)	235
ANNEE D'ENQUETE	1997	48,0	(46,5-49,6)	48,7	(47,1-50,3)	9369
	2001	50,4	(49,0-51,8)	50,3	(48,9-51,8)	10742
	2004	50,4	(49,0-51,9)	50,4	(48,9-51,9)	11582
	2008	48,4	(47,0-49,8)	48,2	(46,7-49,6)	11046

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Total population



Pourcentage de la population qui a eu un contact avec un médecin spécialiste au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone

SP03_1		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	66,0	(56,1-75,8)	94,4	(91,6-96,3)	104
	Femme	67,1	(55,6-78,5)	94,3	(91,1-96,4)	131
GROUPE D'AGE	0 - 24	55,3	(35,9-74,7)	55,3	(36,9-72,4)	54
	25 - 44	75,3	(62,0-88,6)	75,3	(60,5-85,8)	41
	45 - 64	68,5	(54,3-82,8)	68,5	(53,5-80,4)	55
	65 +	71,7	(59,4-84,1)	71,7	(58,0-82,2)	85
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	54,4	(36,8-72,0)	90,0	(81,4-94,9)	53
	Secondaire inférieur	80,2	(64,3-96,2)	97,0	(91,7-99,0)	56
	Secondaire supérieur	60,5	(45,3-75,8)	93,0	(88,0-96,0)	53
	Enseignement supérieur	69,1	(49,1-89,2)	95,5	(89,6-98,1)	48
ANNEE D'ENQUETE	1997	49,2	(41,3-57,2)	49,1	(41,3-57,0)	266
	2001	59,3	(52,2-66,5)	60,3	(53,0-67,2)	261
	2004	57,6	(49,8-65,4)	58,4	(50,4-65,9)	248
	2008	66,6	(58,3-74,8)	67,0	(58,3-74,7)	235

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Total population



**Nombre moyen de contacts avec le médecin spécialiste par personne et par an,
Enquête de santé 2008 - Belgique**

SP05_1		Moyenne brut	+ IC 95 %	Moyenne stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	1,9	(1,7-2,1)	1,9	(1,7-2,1)	5121
	Femme	2,4	(2,2-2,6)	2,4	(2,2-2,6)	5882
GROUPE D'AGE	0 - 24	1,5	(1,3-1,7)	1,5	(1,3-1,7)	2757
	25 - 44	2,1	(1,9-2,4)	2,1	(1,9-2,4)	2795
	45 - 64	2,4	(2,1-2,7)	2,4	(2,1-2,7)	2681
	65 +	2,8	(2,4-3,1)	2,7	(2,4-3,1)	2770
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	2,3	(1,7-2,9)	2,0	(1,4-2,6)	1493
	Secondaire inférieur	2,0	(1,7-2,3)	1,8	(1,5-2,1)	1692
	Secondaire supérieur	2,1	(1,8-2,4)	2,1	(1,9-2,4)	3353
	Enseignement supérieur	2,1	(1,9-2,4)	2,2	(2,0-2,4)	4140
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	1,6	(1,3-1,9)	1,6	(1,3-1,9)	1174
	Brabant Flamand	2,1	(1,6-2,6)	2,1	(1,6-2,6)	621
	Flandre Occidentale	2,0	(1,4-2,7)	2,0	(1,4-2,6)	743
	Flandre Orientale	2,3	(1,8-2,8)	2,3	(1,8-2,8)	741
	Limbourg	1,8	(1,2-2,3)	1,8	(1,2-2,3)	535
	Bruxelles	3,0	(2,7-3,3)	3,0	(2,7-3,3)	3264
	Brabant Wallon	2,4	(1,7-3,1)	2,4	(1,7-3,1)	372
	Hainaut	2,0	(1,7-2,3)	2,0	(1,7-2,3)	1522
	Liège	2,3	(1,9-2,7)	2,3	(1,9-2,7)	863
	Luxembourg	2,1	(1,5-2,6)	2,1	(1,6-2,7)	350
	Namur	2,2	(1,6-2,8)	2,3	(1,7-2,8)	583
	Communauté Germanophone	2,7	(1,5-3,9)	2,6	(1,5-3,8)	235
ANNEE D'ENQUETE	1997	2,0	(1,9-2,2)	2,0	(1,9-2,2)	10121
	2001	2,3	(2,1-2,5)	2,3	(2,1-2,5)	11830
	2004	2,3	(2,1-2,4)	2,3	(2,1-2,4)	12681
	2008	2,1	(2,0-2,3)	2,1	(2,0-2,3)	11003

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Total population



**Nombre moyen de contacts avec le médecin spécialiste par personne et par an,
Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone**

SP05_1		Moyenne brut	+ IC 95 %	Moyenne stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	3,4	(1,2-5,6)	3,9	(1,8-6,0)	104
	Femme	2,2	(1,3-3,1)	2,6	(1,6-3,6)	131
GROUPE D'AGE	0 - 24	2,0	(0,5-3,4)	2,0	(0,7-3,3)	54
	25 - 44	3,4	(1,6-5,1)	3,4	(1,7-5,1)	41
	45 - 64	4,0	(0,9-7,1)	4,0	(1,0-7,1)	55
	65 +	1,5	(0,7-2,3)	1,6	(0,8-2,4)	85
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	0,9	(0,1-1,7)	2,9	(1,2-4,7)	53
	Secondaire inférieur	4,9	(0,7-9,1)	5,5	(1,8-9,2)	56
	Secondaire supérieur	2,3	(0,8-3,9)	2,4	(0,9-3,8)	53
	Enseignement supérieur	2,5	(1,5-3,5)	3,0	(1,8-4,2)	48
ANNEE D'ENQUETE	1997	1,9	(1,3-2,6)	1,9	(1,2-2,5)	291
	2001	2,6	(1,6-3,6)	2,6	(1,6-3,7)	286
	2004	2,0	(1,4-2,6)	2,1	(1,5-2,7)	258
	2008	2,7	(1,5-3,9)	2,8	(1,7-4,0)	235

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Total population



Utilisation du service des urgences (ED)

Pourcentage de la population qui a eu recours à un service d'urgence

En Communauté Germanophone en 2008, 15% de la population a eu recours à un service d'urgence au cours des douze derniers mois.

Il n'y a pas de différence significative à ce sujet entre les hommes et les femmes, ni en fonction de l'âge ou du niveau d'éducation.

Le pourcentage de personnes en Communauté Germanophone qui a eu recours à un service d'urgence au cours des douze derniers mois:

- n'est pas différent que dans les provinces belges, sauf pour ce qui est de la Flandre Occidentale où le taux est plus faible (9%);
- semble avoir augmenté entre 2001-4 (11%) et 2008 (15%), mais cette différence n'est pas significative.



Pourcentage de la population ayant consulté un service d'urgence au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2008 – Belgique

ED01_1		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	14,3	(13,0-15,6)	14,2	(13,0-15,6)	5165
	Femme	12,6	(11,5-13,8)	12,4	(11,3-13,6)	5925
GROUPE D'AGE	0 - 24	15,3	(13,5-17,1)	15,2	(13,5-17,1)	2783
	25 - 44	15,1	(13,2-17,0)	15,1	(13,3-17,1)	2815
	45 - 64	9,5	(8,2-10,8)	9,5	(8,3-10,8)	2709
	65 +	13,7	(11,8-15,6)	13,8	(12,0-15,8)	2783
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	15,4	(12,7-18,0)	15,6	(12,9-18,8)	1507
	Secondaire inférieur	12,9	(10,8-15,0)	13,4	(11,3-15,7)	1696
	Secondaire supérieur	14,1	(12,5-15,7)	13,9	(12,4-15,5)	3370
	Enseignement supérieur	12,3	(10,8-13,8)	11,9	(10,5-13,4)	4181
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	12,3	(9,9-14,7)	12,2	(10,0-14,8)	1180
	Brabant Flamand	12,9	(8,9-17,0)	12,9	(9,4-17,4)	629
	Flandre Occidentale	9,4	(7,0-11,8)	9,3	(7,2-12,0)	744
	Flandre Orientale	13,7	(10,4-16,9)	13,6	(10,7-17,0)	752
	Limbourg	10,1	(7,0-13,2)	10,1	(7,4-13,6)	538
	Bruxelles	17,6	(16,1-19,2)	17,0	(15,5-18,6)	3293
	Brabant Wallon	14,7	(10,5-18,9)	14,5	(10,8-19,2)	377
	Hainaut	15,8	(13,5-18,0)	15,6	(13,5-17,9)	1529
	Liège	14,9	(11,9-17,9)	14,7	(12,0-17,9)	875
	Luxembourg	12,0	(7,7-16,4)	11,4	(7,8-16,4)	352
	Namur	13,7	(10,1-17,4)	13,4	(10,3-17,4)	589
	Communauté Germanophone	15,1	(10,1-20,1)	15,6	(11,0-21,5)	232
ANNEE D'ENQUETE	2001	11,9	(11,0-12,8)	11,7	(10,9-12,6)	11078
	2004	12,0	(11,1-12,9)	11,9	(11,0-12,8)	11917
	2008	13,5	(12,5-14,4)	13,3	(12,4-14,2)	11090

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population totale



Pourcentage de la population ayant consulté un service d'urgence au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone

ED01_1		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	19,4	(10,3-28,5)	19,2	(11,1-31,2)	103
	Femme	11,9	(5,9-17,9)	9,9	(5,1-18,3)	129
GROUPE D'AGE	0 - 24	14,9	(4,4-25,4)	14,7	(7,1-28,0)	53
	25 - 44	12,8	(2,6-23,1)	13,1	(5,9-26,6)	41
	45 - 64	12,2	(2,7-21,8)	12,2	(5,4-25,3)	54
	65 +	20,9	(10,1-31,7)	21,5	(12,6-34,4)	84
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	18,2	(7,6-28,8)	9,3	(4,2-19,5)	54
	Secondaire inférieur	13,6	(2,3-25,0)	13,1	(5,7-27,1)	53
	Secondaire supérieur	18,0	(5,6-30,5)	20,1	(10,1-36,1)	52
	Enseignement supérieur	12,6	(3,4-21,9)	11,9	(4,9-26,0)	47
ANNEE D'ENQUETE	2001	10,4	(6,3-14,4)	9,9	(6,6-14,7)	269
	2004	10,9	(1,4-20,3)	10,6	(4,6-22,5)	246
	2008	15,1	(10,1-20,1)	14,9	(10,2-21,1)	232

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population totale



Contacts avec le dentiste (DC)

En Communauté Germanophone en 2008, 68% de la population déclare avoir consulté un dentiste ou un orthodontiste au cours des douze derniers mois.

Il n'y a pas de différence significative à ce sujet entre les hommes et les femmes, par contre les personnes âgées de 65 ans et plus ont moins fréquemment des contacts avec un dentiste que les personnes plus jeunes.

On n'observe pas ici de différences en fonction du niveau d'éducation.

Le pourcentage de personnes en Communauté Germanophone qui déclarent avoir consulté un dentiste au cours des douze derniers mois:

- est non seulement significativement plus élevé que dans les provinces wallonnes (sauf la province du Luxembourg) mais aussi plus élevé qu'à Bruxelles (57%) ou qu'en Flandre Orientale (59%);
- a varié de manière significative au cours des dix dernières années en adoptant une courbe en forme de U avec une baisse de 60% à 50% entre 1997 et 2001 et une augmentation de 53% à 68% entre 2004 et 2008.



Pourcentage de la population ayant consulté un dentiste au cours des 12 derniers mois,
Enquête de santé 2008 - Belgique

DC06_2		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	55,8	(53,8-57,8)	55,1	(53,0-57,2)	5145
	Femme	60,7	(58,8-62,6)	61,9	(59,9-63,9)	5915
GROUPE D'AGE	0 - 24	59,7	(56,7-62,7)	59,9	(56,8-62,9)	2723
	25 - 44	66,3	(63,7-68,9)	66,4	(63,8-68,9)	2822
	45 - 64	62,4	(59,8-65,0)	62,5	(59,9-65,0)	2709
	65 +	36,6	(33,7-39,5)	36,1	(33,2-39,0)	2806
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	35,4	(31,4-39,5)	40,7	(36,2-45,5)	1513
	Secondaire inférieur	46,7	(42,5-50,9)	48,4	(44,1-52,9)	1711
	Secondaire supérieur	58,8	(56,0-61,6)	58,2	(55,4-61,0)	3354
	Enseignement supérieur	68,9	(66,5-71,3)	67,7	(65,3-70,1)	4154
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	63,7	(59,5-67,9)	64,4	(60,0-68,5)	1174
	Brabant Flamand	62,2	(56,6-67,9)	62,7	(56,8-68,3)	631
	Flandre Occidentale	58,9	(53,8-64,0)	60,4	(55,4-65,3)	754
	Flandre Orientale	56,3	(50,6-62,0)	56,8	(50,8-62,6)	756
	Limbourg	60,0	(53,2-66,7)	59,8	(52,7-66,6)	539
	Bruxelles	57,0	(54,8-59,2)	56,4	(54,0-58,8)	3268
	Brabant Wallon	47,5	(38,2-56,8)	47,3	(37,6-57,2)	376
	Hainaut	53,4	(50,0-56,9)	53,2	(49,6-56,7)	1510
	Liège	59,6	(54,8-64,4)	59,8	(54,8-64,7)	877
	Luxembourg	62,3	(54,9-69,8)	62,9	(55,1-70,0)	346
	Namur	48,9	(42,6-55,3)	48,6	(42,2-55,1)	589
	Communauté Germanophone	67,8	(59,9-75,6)	69,9	(61,6-77,0)	240
ANNEE D'ENQUETE	1997	49,2	(47,5-50,9)	46,8	(45,1-48,6)	9486
	2001	47,9	(46,4-49,4)	47,2	(45,7-48,8)	10789
	2004	49,7	(48,0-51,3)	49,0	(47,3-50,6)	11397
	2008	58,3	(56,7-59,9)	58,7	(57,1-60,3)	11060

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population totale



**Pourcentage de la population ayant consulté un dentiste au cours des 12 derniers mois,
Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone**

DC06_2		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	70,5	(60,3-80,7)	72,1	(59,4-82,0)	106
	Femme	65,8	(54,7-76,9)	70,0	(57,4-80,1)	134
GROUPE D'AGE	0 - 24	81,0	(66,6-95,5)	81,2	(64,0-91,2)	55
	25 - 44	74,0	(58,1-89,9)	74,2	(56,3-86,5)	42
	45 - 64	64,6	(48,6-80,5)	64,9	(48,6-78,3)	56
	65 +	49,6	(36,4-62,7)	50,0	(37,4-62,6)	87
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	52,0	(34,8-69,1)	73,6	(52,8-87,4)	56
	Secondaire inférieur	83,7	(70,7-96,8)	91,3	(82,2-96,0)	56
	Secondaire supérieur	58,6	(39,0-78,3)	57,9	(36,9-76,4)	54
	Enseignement supérieur	73,7	(59,9-87,5)	77,3	(62,2-87,6)	48
ANNEE D'ENQUETE	1997	60,4	(52,1-68,7)	56,4	(47,8-64,7)	268
	2001	50,3	(42,1-58,5)	49,1	(40,9-57,4)	271
	2004	52,5	(43,3-61,6)	51,9	(43,2-60,4)	249
	2008	67,8	(59,9-75,6)	71,3	(62,8-78,5)	240

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population totale



Consommation de médicaments (DR)

En Communauté Germanophone en 2008, 49% de la population déclare avoir utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit par un médecin. Ce taux s'élève à 25% pour les médicaments de comptoir.

Les femmes utilisent plus souvent des médicaments (prescrits ou non) que les hommes. On observe par ailleurs une augmentation de l'utilisation des médicaments sous prescription avec l'âge, alors que ce n'est pas le cas pour les produits de comptoir.

La consommation de médicaments sous prescription ne varie pas en fonction du niveau d'éducation alors que c'est le cas pour les produits de comptoir: 10% des personnes avec un faible niveau d'éducation déclarent avoir utilisé des produits de comptoir contre 34% chez les personnes les plus éduquées. Cette différence est statistiquement significative.

Le pourcentage de personnes en Communauté Germanophone qui déclarent avoir utilisé des médicaments prescrits par un médecin:

- est similaire à ce que l'on observe dans les provinces flamandes, mais significativement plus faible qu'à Bruxelles et dans les provinces wallonnes;
- a augmenté de manière significative entre 1997 et 2001 et diminué entre 2004 et 2008.

Le pourcentage de personnes en Communauté Germanophone qui déclarent avoir utilisé des médicaments de comptoir:

- est similaire à ce que l'on observe dans l'ensemble des provinces belges ainsi qu'à Bruxelles;
- n'a pas varié de manière significative entre 1997 et 2008.



Pourcentage de la population qui a consommé au cours des 2 dernières semaines des médicaments prescrits, Enquête de santé 2008 - Belgique

DR01_1		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	43,4	(41,6-45,3)	44,9	(42,8-47,0)	5209
	Femme	57,7	(55,7-59,7)	59,7	(57,6-61,9)	5984
GROUPE D'AGE	0 - 24	25,9	(23,5-28,2)	25,7	(23,4-28,1)	2798
	25 - 44	39,7	(37,3-42,1)	39,5	(37,1-42,0)	2832
	45 - 64	64,5	(62,1-67,0)	65,0	(62,5-67,4)	2722
	65 +	90,3	(88,6-92,0)	90,2	(88,3-91,8)	2841
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	68,9	(64,1-73,7)	53,5	(47,9-59,1)	1533
	Secondaire inférieur	61,0	(56,9-65,2)	54,6	(50,1-59,0)	1722
	Secondaire supérieur	49,1	(46,5-51,7)	52,9	(50,1-55,6)	3388
	Enseignement supérieur	43,3	(41,1-45,6)	51,0	(48,4-53,6)	4202
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	48,8	(44,7-53,0)	49,6	(45,4-53,9)	1183
	Brabant Flamand	53,9	(48,2-59,6)	55,4	(48,8-61,8)	638
	Flandre Occidentale	47,5	(42,5-52,5)	45,3	(40,4-50,3)	755
	Flandre Orientale	50,0	(45,3-54,8)	50,2	(44,9-55,5)	761
	Limbourg	41,4	(34,8-48,0)	40,1	(34,1-46,4)	547
	Bruxelles	52,0	(49,8-54,1)	57,6	(55,1-60,1)	3322
	Brabant Wallon	48,9	(40,3-57,4)	52,1	(43,4-60,6)	374
	Hainaut	53,6	(50,3-56,9)	57,1	(53,6-60,6)	1537
	Liège	56,2	(51,7-60,8)	59,8	(54,9-64,4)	888
	Luxembourg	50,6	(42,8-58,4)	57,4	(49,4-64,9)	356
	Namur	55,9	(50,4-61,3)	60,8	(54,9-66,4)	591
	Communauté Germanophone	49,1	(38,6-59,5)	44,1	(34,7-53,9)	241
ANNEE D'ENQUETE	1997	40,8	(39,3-42,4)	44,2	(42,5-46,0)	10156
	2001	47,7	(46,3-49,1)	49,3	(47,8-50,8)	12062
	2004	47,3	(45,9-48,8)	48,7	(47,1-50,4)	12881
	2008	50,7	(49,2-52,3)	52,1	(50,5-53,6)	11193

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Total population



Pourcentage de la population qui a consommé au cours des 2 dernières semaines des médicaments prescrits, Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone

DR01_1		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	40,8	(28,2-53,4)	38,4	(23,0-56,5)	107
	Femme	55,3	(43,8-66,8)	55,3	(40,1-69,7)	134
GROUPE D'AGE	0 - 24	9,2	(0,0-19,9)	8,6	(2,7-24,4)	55
	25 - 44	47,4	(26,7-68,1)	46,6	(28,3-65,8)	42
	45 - 64	59,1	(42,6-75,6)	58,3	(41,8-73,2)	57
	65 +	88,9	(81,7-96,2)	88,6	(79,1-94,1)	87
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	74,6	(48,9-100,0)	55,7	(27,4-80,7)	56
	Secondaire inférieur	58,9	(37,7-80,0)	55,3	(36,4-72,7)	57
	Secondaire supérieur	31,2	(10,5-51,8)	38,5	(19,1-62,4)	54
	Enseignement supérieur	48,4	(27,5-69,4)	51,3	(23,4-78,4)	48
ANNEE D'ENQUETE	1997	32,0	(25,3-38,7)	34,5	(26,5-43,6)	294
	2001	43,3	(35,9-50,6)	45,4	(37,3-53,8)	293
	2004	50,0	(41,0-59,0)	52,2	(43,2-61,0)	271
	2008	49,1	(38,6-59,5)	43,1	(33,4-53,3)	241

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Total population



Pourcentage de la population qui a consommé au cours des 2 dernières semaines des médicaments non prescrits, Enquête de santé 2008 - Belgique

DR03_1		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	18,7	(17,1-20,2)	18,5	(17,0-20,2)	5148
	Femme	25,7	(24,0-27,4)	25,8	(24,1-27,5)	5891
GROUPE D'AGE	0 - 24	19,6	(17,2-21,9)	19,5	(17,2-22,0)	2756
	25 - 44	24,8	(22,5-27,1)	24,7	(22,4-27,0)	2806
	45 - 64	23,9	(21,7-26,2)	23,8	(21,7-26,1)	2693
	65 +	20,2	(17,4-23,1)	19,5	(16,8-22,6)	2784
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	16,6	(13,7-19,5)	16,1	(13,3-19,4)	1503
	Secondaire inférieur	20,1	(16,7-23,6)	19,6	(16,3-23,2)	1701
	Secondaire supérieur	19,4	(17,4-21,4)	19,1	(17,2-21,2)	3348
	Enseignement supérieur	26,7	(24,4-29,0)	26,6	(24,4-29,0)	4148
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	20,7	(17,3-24,1)	20,4	(17,2-24,0)	1177
	Brabant Flamand	23,9	(19,0-28,8)	23,4	(18,9-28,6)	632
	Flandre Occidentale	23,1	(18,8-27,5)	23,0	(18,9-27,8)	744
	Flandre Orientale	23,9	(19,6-28,3)	23,7	(19,6-28,3)	754
	Limbourg	15,5	(10,3-20,8)	15,2	(10,8-21,0)	549
	Bruxelles	26,7	(24,7-28,8)	26,4	(24,4-28,5)	3255
	Brabant Wallon	36,6	(28,7-44,5)	36,6	(29,2-44,7)	369
	Hainaut	13,0	(10,6-15,3)	12,7	(10,6-15,2)	1526
	Liège	25,7	(21,5-29,9)	25,4	(21,4-29,8)	872
	Luxembourg	31,5	(24,1-38,9)	31,8	(24,8-39,7)	339
	Namur	27,0	(21,8-32,2)	26,8	(21,8-32,4)	583
	Communauté Germanophone	24,7	(15,8-33,6)	24,3	(16,7-34,1)	239
ANNEE D'ENQUETE	1997	33,2	(31,8-34,7)	32,2	(30,7-33,7)	10145
	2001	27,1	(25,9-28,3)	26,7	(25,5-27,9)	11961
	2004	24,2	(23,0-25,4)	23,7	(22,5-25,0)	12750
	2008	22,3	(21,0-23,6)	21,9	(20,6-23,3)	11039

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Total population



Pourcentage de la population qui a consommé au cours des 2 dernières semaines des médicaments non prescrits, Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone

DR03_1		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	18,3	(9,1-27,6)	18,2	(10,9-28,8)	107
	Femme	29,6	(17,6-41,6)	30,5	(19,6-44,2)	132
GROUPE D'AGE	0 - 24	25,5	(8,2-42,9)	24,6	(11,9-44,1)	55
	25 - 44	31,6	(13,7-49,4)	30,6	(16,6-49,4)	42
	45 - 64	23,0	(7,6-38,4)	21,8	(10,6-39,7)	57
	65 +	20,3	(6,9-33,7)	18,8	(9,4-34,0)	85
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	9,8	(0,0-20,8)	5,1	(1,5-15,9)	55
	Secondaire inférieur	11,9	(0,0-24,8)	9,8	(3,7-23,3)	56
	Secondaire supérieur	35,9	(10,7-61,2)	38,3	(20,1-60,4)	54
	Enseignement supérieur	34,4	(16,4-52,4)	32,0	(17,3-51,5)	48
ANNEE D'ENQUETE	1997	25,5	(18,4-32,5)	23,5	(17,5-30,9)	294
	2001	30,7	(24,0-37,4)	29,7	(23,4-36,9)	290
	2004	21,7	(14,4-29,0)	20,5	(14,5-28,3)	269
	2008	24,7	(15,8-33,6)	23,7	(16,1-33,5)	239

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Total population





4. Santé et Société

Santé et environnement (HE)

Gêne liée à des conditions environnementales

En Communauté Germanophone en 2008, 12% de la population déclare avoir été gênée durant les 12 mois précédant l'enquête par au moins une des conditions environnementales suivantes:

- pollution de l'air;
- mauvaises odeurs venant d'industries proche de la résidence ou d'autres sources;
- accumulation d'immondices;
- humidité;
- moisissures ou champignons;
- vibrations dues au trafic routier, ferroviaire, aérien ou aux entreprises proches;
- bruit du trafic routier, du trafic ferroviaire, tram ou métro, du trafic aérien;
- bruit provenant des entreprises proches;
- bruit de voisinage.

Il n'y a pas de différence à ce sujet entre les hommes et les femmes, ni en fonction de l'âge. Ce taux varie de manière significative toutefois en fonction du niveau d'éducation, avec un pourcentage plus faible (2%) parmi les personnes ayant tout au plus un diplôme de l'enseignement primaire par rapport aux autres (15% à 17%).

Le pourcentage de personnes qui déclarent avoir été gênées durant les 12 mois précédant l'enquête par au moins une des conditions environnementales étudiées est significativement plus faible en Communauté Germanophone qu'à Bruxelles (39%), de même que dans le reste de la province de Liège (21%).

Perturbation du sommeil liée au bruit

En Communauté Germanophone en 2008, 10% de la population (âgée de 15 ans et plus) déclare avoir été gênée pendant son sommeil à cause du bruit:

- 2% ont été faiblement gênés;
- 8% ont été gênés de manière sérieuse.

Il n'y a pas de différence à ce sujet entre les hommes et les femmes, ni en fonction de l'âge ou du niveau d'éducation.

Le pourcentage de personnes qui déclarent avoir été gênées dans leur sommeil à cause du bruit durant les 12 mois précédant l'enquête est significativement plus faible en Communauté Germanophone qu'à Bruxelles (47%) et que dans toutes les provinces belges (sauf par rapport à la Flandre Occidentale – 17% et la province du Luxembourg – 17%).



Pourcentage de la population (âgée de 15 et plus) qui est gênée à la maison par au moins une des conditions environnementales prises en compte* au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2008 - Belgique

HE01_1		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand**	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	17,0	(15,4-18,7)	16,6	(15,0-18,4)	3654
	Femme	18,8	(17,2-20,4)	18,7	(17,1-20,4)	4432
GROUPE D'AGE	15 - 24	15,4	(11,8-19,1)	15,4	(12,1-19,4)	877
	25 - 44	21,6	(19,1-24,0)	21,5	(19,2-24,0)	2458
	45 - 64	18,0	(15,9-20,1)	18,0	(15,9-20,2)	2425
	65 +	13,5	(11,1-15,9)	13,4	(11,1-16,0)	2326
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	15,2	(12,0-18,4)	17,1	(13,6-21,1)	1154
	Secondaire inférieur	20,1	(16,3-23,9)	20,8	(17,0-25,0)	1341
	Secondaire supérieur	17,6	(15,3-20,0)	17,1	(14,9-19,6)	2478
	Enseignement supérieur	18,0	(15,8-20,3)	16,8	(14,7-19,2)	2921
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	14,2	(11,1-17,4)	14,0	(11,2-17,5)	934
	Brabant Flamand	14,5	(10,3-18,7)	14,2	(10,6-18,8)	517
	Flandre Occidentale	11,1	(7,2-15,1)	11,1	(7,8-15,7)	622
	Flandre Orientale	17,0	(11,8-22,1)	16,7	(12,1-22,5)	545
	Limbourg	16,0	(9,8-22,3)	15,7	(10,5-22,9)	424
	Bruxelles	38,7	(36,1-41,4)	38,0	(35,4-40,7)	2154
	Brabant Wallon	14,6	(8,6-20,6)	14,1	(9,2-20,9)	262
	Hainaut	17,7	(14,7-20,8)	17,4	(14,6-20,6)	1084
	Liège	21,2	(16,7-25,8)	20,9	(16,7-25,8)	686
	Luxembourg	19,1	(12,2-26,0)	18,7	(12,8-26,6)	251
	Namur	16,6	(11,3-22,0)	16,5	(11,8-22,5)	416
Communauté Germanophone	12,1	(6,4-17,9)	12,2	(7,5-19,2)	191	
ANNEE D'ENQUETE	2008	18,0	(16,6-19,3)	17,6	(16,3-19,1)	8086

* Les conditions environnementales prises en compte sont: la pollution de l'air; mauvaises odeurs venant d'industries proches; mauvaises odeurs venant d'autres sources (égouts, déchets, engrais); l'accumulation d'immondices; l'humidité; les moisissures ou champignons; vibrations dues au trafic routier, ferroviaire, aérien ou aux entreprises proches; le bruit du trafic routier; le bruit du trafic ferroviaire; bruit du trafic aérien; bruit provenant des entreprises proches (usine, atelier); bruit de voisinage

**Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Pourcentage de la population (âgée de 15 et plus) qui est gênée à la maison par au moins une des conditions environnementales prises en compte* au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone

HE01_1		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand**	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	13,4	(4,6-22,1)	1,2	(0,6-2,7)	80
	Femme	11,3	(4,8-17,9)	1,1	(0,6-2,0)	111
GROUPE D'AGE	15 - 24	7,0	(0,0-19,4)	7,2	(1,2-32,0)	23
	25 - 44	14,2	(0,0-31,4)	14,4	(4,2-39,4)	39
	45 - 64	9,1	(2,2-16,0)	9,2	(4,3-18,5)	56
	65 +	17,6	(5,7-29,6)	18,0	(8,8-33,2)	73
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	2,4	(0,0-7,4)	0,1	(0,0-1,1)	50
	Secondaire inférieur	15,5	(3,4-27,6)	1,1	(0,3-4,1)	51
	Secondaire supérieur	16,3	(1,1-31,5)	2,2	(0,9-5,6)	36
	Enseignement supérieur	17,1	(0,2-33,9)	1,8	(0,6-5,3)	36
ANNEE D'ENQUETE	2008	12,1	(6,4-17,9)	1,2	(0,7-2,0)	191

* Les conditions environnementales prises en compte sont: la pollution de l'air; mauvaises odeurs venant d'industries proches; mauvaises odeurs venant d'autres sources (égouts, déchets, engrais); l'accumulation d'immondices; l'humidité; les moisissures ou champignons; vibrations dues au trafic routier, ferroviaire, aérien ou aux entreprises proches; le bruit du trafic routier; le bruit du trafic ferroviaire; bruit du trafic aérien; bruit provenant des entreprises proches (usine, atelier); bruit de voisinage

**Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



Distribution de la population (âgée de 15 et plus) selon le degré de perturbation du sommeil liée au bruit quel qu'en soit la source* au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2008 - Belgique

HE02_1		sommeil pas du tout perturbé	sommeil légèrement ou moyennement perturbé	sommeil beaucoup ou extrêmement perturbé	N
SEXE	Homme	75,2	4,9	19,8	3721
	Femme	73,1	5,3	21,6	4509
GROUPE D'AGE	15 – 24	74,0	4,3	21,7	891
	25 – 44	70,6	6,1	23,3	2498
	45 – 64	73,5	5,4	21,1	2465
	65 +	80,8	3,6	15,6	2376
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	75,9	5,1	19,0	1181
	Secondaire inférieur	75,5	5,4	19,0	1365
	Secondaire supérieur	76,6	4,8	18,6	2512
	Enseignement supérieur	71,1	5,3	23,6	2972
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	76,5	3,1	20,4	937
	Brabant Flamand	61,5	5,3	33,2	522
	Flandre Occidentale	82,9	1,9	15,2	623
	Flandre Orientale	74,8	5,2	20,1	559
	Limbourg	76,5	6,1	17,4	437
	Bruxelles	52,7	14,8	32,6	2236
	Brabant Wallon	75,4	5,6	19,0	264
	Hainaut	79,5	4,2	16,3	1096
	Liège	80,0	3,5	16,5	697
	Luxembourg	83,1	4,4	12,5	252
	Namur	76,3	4,8	18,9	416
	Communauté Germanophone	89,7	2,3	8,0	191
ANNEE D'ENQUETE	2008	74,1	5,1	20,8	8230

* Les sources de bruit prises en compte proviennent du trafic routier, du trafic ferroviaire, du trafic aérien, des entreprises proches (usine, atelier), du voisinage - Population de 15 ans et plus



Distribution de la population (âgée de 15 et plus) selon le degré de perturbation du sommeil liée au bruit quel qu'en soit la source* au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2008 - Communauté germanophone

HE02_1		sommeil pas du tout perturbé	sommeil légèrement ou moyennement perturbé	sommeil beaucoup ou extrêmement perturbé	N
SEXE	Homme	92,6	2,1	5,3	80
	Femme	87,8	2,4	9,8	111
GROUPE D'AGE	15 - 24	87,0	7,0	6,0	23
	25 - 44	88,5	1,4	10,1	39
	45 - 64	91,0	2,7	6,4	55
	65 +	90,3	0,0	9,7	74
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	93,4	0,0	6,6	50
	Secondaire inférieur	79,5	6,9	13,6	51
	Secondaire supérieur	90,6	0,9	8,5	36
	Enseignement supérieur	95,7	0,0	4,3	36
ANNEE D'ENQUETE	2008	89,7	2,3	8,0	191

* Les sources de bruit prises en compte proviennent du trafic routier, du trafic ferroviaire, du trafic aérien, des entreprises proches (usine, atelier), du voisinage - Population de 15 ans et plus



Santé sociale (SO)

En Communauté Germanophone en 2008, 7,5% de la population déclare bénéficier d'un support social limité (peu ou pas de personnes sur qui compter en cas de problème, peu ou pas de personnes qui manifestent de l'attention, de l'intérêt, ...).

Il n'y a pas de différence significative à ce sujet entre les hommes et les femmes. Les personnes âgées de 45 ans et plus semblent déclarer plus souvent qu'elles manquent de support social que les plus jeunes, mais cette différence n'est pas statistiquement significative.

On n'observe pas ici de différence significative en fonction du niveau d'éducation.

Le pourcentage de personnes qui déclarent bénéficier d'un support social limité est significativement plus faible en Communauté Germanophone que dans les provinces wallonnes, mais aussi plus faible qu'à Bruxelles (23%) ou Anvers (13%).



Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) qui indique un support social limité,
Enquête de santé 2008 - Belgique

SO_5		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	15,1	(13,6-16,6)	14,6	(13,2-16,1)	3483
	Femme	16,0	(14,5-17,4)	15,1	(13,7-16,7)	4079
GROUPE D'AGE	15 - 24	9,2	(6,9-11,4)	9,2	(7,1-11,7)	902
	25 - 44	13,1	(11,4-14,9)	13,1	(11,5-15,0)	2347
	45 - 64	17,0	(14,9-19,1)	17,0	(15,0-19,2)	2339
	65 +	21,6	(18,6-24,5)	21,5	(18,7-24,6)	1974
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	24,5	(20,3-28,6)	21,7	(17,8-26,2)	945
	Secondaire inférieur	19,9	(16,5-23,3)	18,2	(15,1-21,7)	1207
	Secondaire supérieur	16,9	(14,8-19,1)	16,8	(14,7-19,1)	2349
	Enseignement supérieur	10,1	(8,6-11,5)	10,1	(8,8-11,7)	2888
LIEU DE RESIDENCE (PROVINCE)	Anvers	12,8	(9,9-15,7)	12,2	(9,7-15,3)	889
	Brabant Flamand	12,0	(8,8-15,3)	11,2	(8,5-14,6)	511
	Flandre Occidentale	13,6	(9,9-17,3)	12,7	(9,6-16,6)	582
	Flandre Orientale	11,3	(7,9-14,8)	10,6	(7,9-14,2)	576
	Limbourg	12,0	(8,2-15,9)	11,5	(8,4-15,7)	435
	Bruxelles	22,9	(20,6-25,2)	22,9	(20,6-25,4)	1922
	Brabant Wallon	19,2	(11,4-27,0)	18,3	(11,9-27,1)	234
	Hainaut	20,2	(17,0-23,5)	19,4	(16,3-22,8)	957
	Liège	20,4	(16,0-24,7)	19,4	(15,6-24,0)	665
	Luxembourg	17,3	(10,2-24,5)	17,2	(10,9-26,0)	236
	Namur	21,5	(16,1-27,0)	20,8	(16,0-26,6)	371
	Communauté Germanophone	7,5	(3,8-11,2)	6,7	(4,0-10,9)	184
ANNEE D'ENQUETE	2008	15,5	(14,4-16,7)	14,9	(13,8-16,1)	7562

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus



**Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) qui indique un support social limité,
Enquête de santé 2008 - Communauté Germanophone**

SO_5		Taux brut (%)	+ IC 95 %	Taux stand*	+ IC 95 %	N
SEXE	Homme	7,4	(0,7-14,0)	0,1		80
	Femme	7,6	(2,4-12,8)	0,1		104
GROUPE D'AGE	15 - 24	0,0		0,0		23
	25 - 44	2,6	(0,0-8,0)	2,6	(0,4-16,0)	37
	45 - 64	12,4	(3,8-21,1)	12,3	(6,0-23,6)	55
	65 +	8,2	(1,8-14,6)	8,1	(3,6-17,2)	69
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	6,8	(0,0-13,9)	0,0		47
	Secondaire inférieur	4,3	(0,0-9,5)	0,0		46
	Secondaire supérieur	9,3	(0,0-19,4)	0,0		38
	Enseignement supérieur	10,0	(0,3-19,6)	0,0		37
ANNEE D'ENQUETE	2008	7,5	(3,8-11,2)	0,1		184

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2001 comme référence) - Population de 15 ans et plus

